Fitokem

CATALOGO 2020

Difesa

Insetticidi

Nutrizione

Corroboranti

Biostimolanti

Biotecnologie

Microrganismi

Lotta integrata

Lotta biologica

Indice alfabetico

ACIDI CORRETTORI PH	pag.55
ALADDIN	pag.39
ALGA STOP	pag.4
ALGATER	pag.40
BAGNANT	pag.41
BENZOTAL	pag.5
BIG ROOT	pag.30
BIO ACTIVE	pag.18
BIO MIX	pag.19
BIO NUTRIC	pag.20
BIO ORANGE	pag.21
BIO STORM	pag.22
BONAMET	pag.31
CUPRUM RED	pag.43
CUPRUMIL	pag.42
DOSAMATIC	pag.64
FERTIMAX	pag.44
FITO N30	pag.45
FITOBACTER	pag.6
FITOCURE	pag.46
FITOSAN	pag.7
FORTOX	pag.8
FUSARID	pag. 9
GEOSAN	pag.10
GRASSO SERRA	pag.57
GREEN SANO	pag.61
GUANTI NITRILE	pag.64
HYDROSAN	pag.11
IDROPONIX	pag.12
JET SAN	pag.64
KARAK 85	pag.13
KIZAN	pag.47
KONTAT	pag.23
LASTING	pag.58
LEKAN	pag.32
MASTER K	pag.48
NEEMIL (NEEM OLIO)	pag.24
NUTRIS	pag.33
ORTEK 30/20	pag.49
PIRETRO NATURA	pag.25
PISTER	pag.26
RACAL	pag.50
RADICOS	pag.51
RADIFAST PGPR	pag.34
SANA FOG	pag.14
SANAPLANT Ag	pag.15
SCUDO	pag.59
SERAMYL	pag.35
SILKILL	pag. 28
SLEEK	pag.56
STARTING PGPR	pag.36
STERICID	pag.16
TAMIKO	pag.27
TRAPPOLE CROMATICHE	pag.56
TRIXO	pag.37
VERY GREEN	pag.62
VITALITY	pag.52
WIDES	pag.63
ZOLFO 50	pag.53

DIFESA VS PATOGENI

DECONTAMINANTI

DISINFETTANTI

EFFETTO RESIDUALE

ALGA STOP®

DISGREGANTE ANTIALGA

PER SERRE E STRUTTURE

- Aione detergente disincrostante su alghe, muschio e mucillaggini
- Inattiva e disgrega le colonie algali
- Rimuove sia le alghe presenti sulle superfici che quelle vaganti nelle acque
- Ridona all'ambiente lo stato di salubrità necessario
- Ideale per BANCALI, TELI, PASSATOIE, VASI ATTREZZATURE, VASCHE
- Inibente nelle vasche di raccolta
- Ottimo come preventivo e copertura
- Azione anche sulle acque di irrigazione
- Tempi di contatto brevissimi
- Residuale
- Sicuro per gli operatori
- Non è fitotossico uso in presenza di piante
- Non corrode i materiali
- No risciacquo

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzazione
Immersione

COMPOSIZIONE

Sali quaternari d'ammonio
Sequestranti
Glicoli
Sinergizzanti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	7 +/- 0,5
Densità	1 +/- 0,1
Odore	Leggero
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

STERICID
PROTOGEN

CONFEZIONI

Fustino	10 lt
Fustino	32 lt
Fusto	210 lt

SU SUPERFICI: dosare 3 - 4 litri in 100 litri di acqua, bagnare abbondantemente.

SU VASCHE FLUSSO/RIFLUSSO E TELI SUB IRRIGANTI : dosare 50 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua, mantenere la dose costante fino ad eliminazione delle alghe e del muschio. Dosare all'occorrenza.

SU COLLETTI E VASI (IMPIANTI A GOCCIA E SPAGHETTI) : dosare 40 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua, mantenere la dose costante fino ad eliminazione delle alghe e del muschio. Dosare all'occorrenza.

SU ALBERI E SIEPI : dosare 60 grammi di prodotto ogni 100 litri di acqua, bagnare nelle ore serali.

SU PIANTE IN VIVAIO (foglia liscia) : dosare 50 grammi di prodotto ogni 100 litri di acqua. Dosare all'occorrenza.

SU BACINI E VASCHE : dosare 20 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua, reintegrando la quantità necessaria in base all'immissione di acqua.

Fitokem

FOOD GRADE

BENZOTAL®

ACIDIFICANTE / SANIFICANTE A LENTO RILASCIO GRANULARE

FOOD GRADE

FORMULAZIONE

Solido a scagliette

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Spaglio

COMPOSIZIONE

Acido benzoico
Benzoato di sodio
Benzoato di potassio

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bianco
pH	2,8
Densità	1,32
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	2,9 gr/lt (scarsa)

MISCIBILITA'

Non pertinente

CONFEZIONI

Secchio 18 kg

- Azione protettiva in prevenzione e curativa
- Evita la formazione di microfilm organico e la proliferazione di agenti patogeni
- Evita che le acque di sgrondo possano propagare infezioni
- Evita che eccessivi ristagni d'acqua possano generare marcescenze ed inoculi
- Residuale nel tempo (poco solubile in acqua)
- Azione sanificante anche sulle acque di sistemi flusso e riflusso
- Ritarda la formazione delle alghe
- Preserva le condizioni ottimali delle radici che fuoriescono dai vasi.
- Mantiene il pH della superficie verso un valore sub-acido
- Non è fitotossico
- Non corrode i materiali
- No risciacquo

Distribuire a spaglio su tutta la superficie da trattare.

SUPERFICI ALL' APERTO:

DISTRIBUIRE 10 - 15 KG ogni 1000 m^2.

SUPERFICI COPERTE:

DISTRIBUIRE 6 - 9 KG ogni 1000 m^2.

BANCALI: DISTRIBUIRE 3- 5 KG ogni 1000 m^2.

ZONE DI PASSAGGIO: DISTRIBUIRE 6 KG ogni 1000 m^2.

SU VOLUME: DISTRIBUIRE 1 KG / 1 m^3.

Fitokem

SAL 10^{-6}

FITOBACTER®

AZIONE SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

CONCIME CE
Zinco (Zn) solubile in acqua 2%

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-6}

BIO
RESIDUO ZERO
VEGAN

- Aiuta le piante sia in maniera preventiva che curativa. Ottimo controllo delle superfici.
- Aumento delle difese endogene nei confronti di stress BIOTICI (patogeni)
- Agisce in velocemente decontaminando e disgregando il biofilm organico
- L'uso costante aiuta a mantenere le piante e l'ambiente in condizioni ottimali di sanità
- Evita che le acque di irrigazione possano propagare malattie
- Cauterizza le ferite post-taglio o spuntatura in quanta gamma su aromatiche e floricole elimina l'eccesso di pectina.
- Protegge le radici e l'apparato fogliare durante il trapianto
- Favorisce la cicatrizzazione post innesto
- Impedisce la formazione di alghe negli impianti, negli alveoli, sui vasi , nelle vasche
- Decontamina acque stantie di pozzi e vasche
- Tampona e stabilizza le acque di irrigazione verso un pH leggermente acido
- Ossigena le radici favorendone lo sviluppo e l'assimilazione dei nutrienti
- Favorisce lo scioglimento del calcare e residui di concimi negli impianti
- Agisce da disintossicante in caso di trattamenti errati, eliminando residui da foglie e radici.
- Non favorisce lo sviluppo di cloro derivati
- Elimina la produzione di etilene.
- In emergenza i trattamenti possono essere ripetuti a distanza di pochi giorni
- Non ha tempo di carenza
- TESTATO DA VARI ORGANI COMPETENTI
- ECONOMICO

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Concime ce

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Zinco Solfato
Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

NON MISCIBILE
Rameici, Organici, Chelati

MISCIBILE
Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg (box 12 pz)
Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

IN CASO DI EMERGENZA RIPETERE EFFETTUARE TRATTAMENTI A 3 GIORNI

Trattamento seminiera pre-trapianto 150 cc per 100 litri d'acqua immersione delle seminiere per 1 o 2 minuti, quindi procedere al trapianto

Giovani Piantine al trapianto, o post semina alla prima foglia vera, 100 cc per 100 litri di acqua (trattamento fogliare o fertirrigazione) ripetere ogni 5-7 giorni.

Floricole ed ornamentali in serra fogliare da 150 cc per 100 litri di acqua, in presenza di fiori 100 cc per 100 litri di acqua distribuire per 800 / 1000 m^2 , ripetere ogni 7-10 giorni.

Fertirrigazione soluzione madre 1,5 lt di prodotto + 8,5 lt di acqua dosatore al 1%.

Flusso e riflusso aggiungere ogni 10-15 giorni 250 cc per ogni m^3 di soluzione. In emergenza per problemi radicali 1 litro per 1 m^3 .

In continuo nelle acque di irrigazione e fertirrigazione da 80 a 150 cc per 1 m3 di acqua.

Ortive e verdura sotto serra fogliare prima e quarta gamma 150 cc per 100 litri di acqua. Ogni 7 giorni. Post taglio 150 cc per 100 lt di acqua. Fertirrigazione 2 kg /1000 m^2 ogni 5-7 giorni.

Aromatiche e piantine in vaso trattamenti fogliari 150 cc per 100 litri di acqua. Fertirrigazione con piogge distribuire 2 kg per 1000 m^2negli ultimi minuti di irrigazione.

Frutteti, ortaggi e verdure in campo trattamenti fogliari 2 kg in 800-1000 lt di acqua per Ha

Talee e bulbi prima del trapianto 100 cc in 100 litri di acqua immergere per 1 minuto.

Si consiglia in abbinamento al BAGNANT

Fitokem

SAL 10^{-6}

FITOSAN®

AZIONE SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

CONCIME CE
Zinco (Zn) solubile in acqua 2%

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-6}

BIO
RESIDUO ZERO
VEGAN

- Aiuta le piante sia in maniera preventiva che curativa. Ottimo controllo delle superfici.
- Aumento delle difese endogene nei confronti di stress BIOTICI (patogeni)
- Agisce in velocemente decontaminando e disgregando il biofilm organico
- L'uso costante aiuta a mantenere le piante e l'ambiente in condizioni ottimali di sanità
- Evita che le acque di irrigazione possano propagare malattie
- Cauterizza le ferite post-taglio o spuntatura in quanta gamma su aromatiche e floricole elimina l'eccesso di pectina.
- Protegge le radici e l'apparato fogliare durante il trapianto
- Favorisce la cicatrizzazione post innesto
- Impedisce la formazione di alghe negli impianti, negli alveoli, sui vasi , nelle vasche
- Decontamina acque stantie di pozzi e vasche
- Tampona e stabilizza le acque di irrigazione verso un pH leggermente acido
- Ossigena le radici favorendone lo sviluppo e l'assimilazione dei nutrienti
- Favorisce lo scioglimento del calcare e residui di concimi negli impianti
- Agisce da disintossicante in caso di trattamenti errati, eliminando residui da foglie e radici.

IN CASO DI EMERGENZA RIPETERE EFFETTUARE TRATTAMENTI A 3 GIORNI

Trattamento seminiera pre-trapianto 150 cc per 100 litri d'acqua immersione delle seminiere per 1 o 2 minuti, quindi procedere al trapianto

Giovani Piantine al trapianto, o post semina alla prima foglia vera, 100 cc per 100 litri di acqua (trattamento fogliare o fertirrigazione) ripetere ogni 5-7 giorni.

Floricole ed ornamentali in serra fogliare da 150 cc per 100 litri di acqua, in presenza di fiori 100 cc per 100 litri di acqua distribuire per 800 / 1000 m^2 , ripetere ogni 7-10 giorni.

Fertirrigazione soluzione madre 1,5 lt di prodotto + 8,5 lt di acqua dosatore al 1%.

Flusso e riflusso aggiungere ogni 10-15 giorni 250 cc per ogni m^3 di soluzione. In emergenza per problemi radicali 1 litro per 1 m^3 .

In continuo nelle acque di irrigazione e fertirrigazione da 80 a 150 cc per 1 m3 di acqua.

Ortive e verdura sotto serra fogliare prima e quarta gamma 150 cc per 100 litri di acqua. Ogni 7 giorni. Post taglio 150 cc per 100 lt di acqua. Fertirrigazione 2 kg /1000 m^2 ogni 5-7 giorni.

Aromatiche e piantine in vaso trattamenti fogliari 150 cc per 100 litri di acqua. Fertirrigazione con piogge distribuire 2 kg per 1000 m^2negli ultimi minuti di irrigazione.

Frutteti, ortaggi e verdure in campo trattamenti fogliari 2 kg in 800-1000 lt di acqua per Ha

Talee e bulbi prima del trapianto 100 cc in 100 litri di acqua immergere per 1 minuto.

Si consiglia in abbinamento al BAGNANT

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Concime ce

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Zinco Solfato
Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

NON MISCIBILE
Rameici, Organici, Chelati

MISCIBILE
Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg (box 12 pz)
Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

Fitokem

Supporto Tecnico 391 71 56 500 — fitokem@fitokem.com — www.fitokem.com

SAL 10^{-6}

FORTOX®

SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

AMBIO SPETTRO senza RESIDUO

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-6}

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Immersione
spruzzo

COMPOSIZIONE

Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Con acqua .

CONFEZIONI

Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

- Agisce in velocemente decontaminando e disgregando il biofilm organico e con esso batteri, funghi, spore, muffe
- Riporta gli ambienti nello stato ottimale di sanità
- Garantisce la totale rimozione di alghe e mucillaggini
- Favorisce lo scioglimento del calcare e residui di concimi negli impianti
- Ambienti praticabili dopo poche ore
- ECONOMICO
- Ideale per serre, vasche, bancali, attrezzature, carrelli, vassoi, polistiroli, vasi, seminiere
- NON OCCORRE RISCIACQUARE
- Ottimo come disincrostante di impianti di coltivazioni fuori suolo anche in presenza di piante
- Ottimo come rigenerante e sanificante di panetti per fuori suolo

Sanificante / decontaminante per superfici diluire 300 cc di prodotto in 100 litri di acqua

Disincrostante per impianti rimozione di residui di concime, alghe, mucillaggini riempire l'impianto con 500 cc per 100 litri di acqua, lasciare agire per 4-6 ore, quindi scaricare l'impianto.

Rivitalizzante di acque stantie dosare 50 cc per 1 m^3 direttamente nelle basche di accumulo o raccolta

Disincrostante per impianti fuori suolo 200 cc per 100 litri di acqua, oppure calcolare la superficie effettiva dei panetti e dosare 2 litri per 1000 m^2

Rigenerante per panetti fuori suolo dosare 300 cc per 100 litri di acqua, dosare nei panetti fino allo sgrondo. I panetti sono pronti dopo 2 giorni.

Fitokem

POTENZIATO SAL 10^{-3}

FUSARID®

SANIFICANTE / DECONTAMINANTE
AZIONE SU MICROFILM ORGANICO

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-3}

- TESTATO con un livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-3}
- Disgrega e deterge il microfilm organico
- Rimuove funghi
- Rimuove spore e conidi
- Rimuove virus
- Rimuove batteri (gram + e gram -)
- Ottimo come preventivo e copertura
- Azione sanificante anche sulle acque di irrigazione
- Tempi di contatto brevissimi
- Residuale
- Risolutivo e sicuro
- Non è fitotossico
- Non corrode i materiali
- No risciacquo

SU SUPERFICIE: Dosare 200/300 cc per 100 lt di acqua distribuire su 1000 m^2.

DOSE D'URTO SU SUPERFICIE: Dosare 3 lt per su 1000 m^2.

COME SANIFICANTE DELLE ACQUE NEI SISTEMI FLUSSO E RIFLUSSO: Dosare 1 lt ogni 1000 litri di acqua.

COME SANIFICANTE NEGLI IMPIANTI A GOCCIA: Dosare 200 cc per 100 litri di acqua.

In caso di utilizzo situazioni in cui il prodotto possa andare a contatto con le piante non superare i 200/300 cc per ettolitro di acqua.

Dopo la sanificazione gli ambienti sono agibili trascorse 2 ore.

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzatore, lancia, immersione

COMPOSIZIONE

PENTADIALE
SEQUESTRANTI
STABILIZZANTI

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	INCOLORE
pH	3,5+/- 0,5
Densità	1 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

ALGA STOP
STERICID
PROTOGEN

CONFEZIONI

Flaconi	1 Kg - 12 pz x box
Fustino	10 Kg
Fustino	32 Kg

Fitokem

SAL 10^{-6}

GEOSAN®

RISANANTE DEL TERRENO DI COLTIVAZIONE

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

CONCIME CE

Zinco (Zn) solubile in acqua 2%

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-6}

- Effetto risanante del terreno e delle radici
- Ossigena le radici favorendone lo sviluppo e l'assimilazione dei nutrienti
- Aiuta le piante colpite alle radici da malattie batteriche, fungine, virus
- Favorisce un pH sub-acido
- Agisce in velocemente decontaminando e disgregando le matrici organiche
- Aiuta l'apparato radicale al superamento di stress da ristagni idrici o forti piogge
- Evita marcescenze ed accumuli di residui fonti di nutrimento per microrganismi patogeni
- Non favorisce lo sviluppo di cloro derivati
- Mantiene controllata la microflora patogena nei substrati
- Agisce da disintossicante in caso di trattamenti errati, eliminando residui
- Aiuta la cauterizzazione di ferite apportate alle radici da azioni meccaniche o insetti
- In emergenza può essere applicato a distanza di pochi giorni
- Protegge l'apparato radicale nelle operazioni delicate come durante il trapianto
- Non ha tempo di carenza
- Disgrega accumuli di concimi e fitofarmaci nel terreno, garantendo sempre un buon equilibrio
- ECONOMICO

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Concime ce

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Zinco Solfato
Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

NON MISCIBILE
Rameici, Organici, Chelati

MISCIBILE
Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg (box 12 pz)
Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

APPLICAZIONE con manichetta, aspersione, fertirrigazione, a pioggia

Pre-semina o pre-trapianto 5-8 litri per 1000 m^2 terreno praticabile dopo due giorni.

In presenza di piante 2-3 litri per 1000 m^2 ripetere ogni 15/20 giorni o in caso di emergenza

Preparazione ad inoculi 3-5 litri per 1000 m^2 inoculare microrganismi dopo 3 giorni dall'applicazione

Si consiglia in abbinamento al BAGNANT Zn

Fitokem

ESENTE DA CLORO

HYDROSAN®

SANIFICANTE / DECONTAMINANTE
AMBIO SPETTRO senza RESIDUO
PER ACQUE DI LAVAGGIO 4ª GAMMA
Preserva le ANTOCIANINE e L'ACIDO ASCORBICO

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-6}

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Immersione
spruzzo

COMPOSIZIONE

Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Con acqua .

CONFEZIONI

Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

- Agisce in velocemente decontaminando e disgregando il biofilm organico e con esso batteri, funghi, spore, muffe
- Favorisce lo scioglimento delle incrostazioni di concimi o trattamenti
- Garantisce una perfetta pulizia del taglio
- Evita l'imbrunimento dei tagli post-raccolta
- Ottimo sostituto del cloro e cloro derivati
- ECONOMICO
- Grazie allo sviluppo di Ossigeno attivo mantiene sempre le acque di lavaggio nelle condizioni ottimali di salubrità.
- Non altera la risulta dei lavaggi in quanto si degrada velocemente

Lavaggio in continuo: immettere il prodotto nel circuito alla dose di 2/5 cc in 100 litri di acqua di lavaggio.

Lavaggio ad immersione: preparare la vasca con 20 cc di prodotto per 100 litri di acqua, Attendere circa secondi 30 secondi.

Fitokem

DECONTAMINANTE

IDROPONIX®

AZIONE SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

IDROPONICA

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Immersione
spruzzo

COMPOSIZIONE

Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Con acqua .

CONFEZIONI

Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

- Mantiene le condizioni sanitarie ottimali per le acque di circolo negli impianti e nelle vasche
- Favorisce una corretta ossigenazione delle acque e delle radici
- Agisce velocemente verso le colonie di microrganismi
- Disgrega matrici di microfilm organico
- Rallenta ed evita la formazione di mucil-lagini ed alghe
- Disgrega eventuali depositi di concimi insoluti
- Mantiene pulite le valvole e le vasche
- Alle concentrazioni indicate non dan-neggia i materiali
- Tampona e stabilizza le acque di irriga-zione verso un pH leggermente acido
- Economico

Dosare 30 ml per 1 metro cubo di acqua in circolo, integrare all'rabbocco

Fitokem

DECONTAMINANTE

KARAK 85®

AZIONE SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

CONCIME MINERALE SEMPLICE - POTASSIO

SALI MISTI POTASICI K_2O 39%

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Granulare

INQUADRAMENTO

Concime minerale semplice

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Carbonato acido di potassio,
Disperdenti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bianco
pH	8 +/- 0,5
Densità	0,7 +/- 0,03 gr/ml
Odore	Nessuno
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

MISCIBILE
Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Secchiello 3 kg
Secchio 15 kg

- Coadiuvante nella lotta a oidio, botrite, ticchiolatura, monilia.
- Favorisce una bilanciatura del pH verso valori alcalini.
- Aumenta la pressione osmotica sulla superficie fogliare
- Rende l'ambiente inadatto a proliferazioni organiche
- Aiuta la naturale disgregazione delle mucillaggini organiche.
- Ottima adesività
- Ottima resistenza al dilavamento

Dosare da 300 a 500 grammi per ettolitro di acqua.
Prima dell'utilizzo si consiglia sempre una prova di compatibilità.

Fitokem

AZIONE TOTALE

SANA FOG®

FUMIGANTE PER SERRE ED AMBIENTI

SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

SANIFICANTE/DECONTAMINANTE per superfici, pareti ed aria. Per locali destinati sia ad allevamenti animale che coltivazioni vegetali. Si tratta di una miscela inerte che brucia senza produrre fiamma i cui fumi non risultano essere tossici o irritanti per le persone.

L'applicazione viene eseguita previo calcolo della cubatura dell'ambiente da trattare e arrestando gli eventuali sistemi di ventilazione forzata presenti. I locali devono successivamente rimanere chiusi e senza la presenza di persone, animali o piante fino alla completa sedimentazione dei fumi (8-12 ore dall'inizio del trattamento). Il locale è utilizzabile in seguito alla totale sedimentazione dei fumi e areazione.

Confezioni disponibili

Barattoli 24 pz x 25 - 50 m³

Barattoli 24 pz x 50 - 100 m³

Barattoli 18 pz x 150 - 300 m³

Barattoli 12 pz x 250 - 500 m³

Barattoli 6 pz x 500 - 1000 m³

Barattoli 4 pz x 1500 - 3000 m³

FORMULAZIONE

Polvere

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Non pertinente

COMPOSIZIONE

Ortofenilfenolo

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Non pertinente
pH	Non pertinente
Densità	Non pertinente
Odore	Non pertinente
Solubilità H_2O	Non pertinente

MISCIBILITA'

Non pertinente

CONFEZIONI

Barattoli x 25-50 m³

Fitokem

CONFORME PT2, PT3,PT4,PT5

SANAPLANT Ag®

SANIFICANTE / DECONTAMINANTE

PER SERRE ED ACQUE DI IRRIGAZIONE

Livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-3}

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nelle acque di processo

COMPOSIZIONE

Acqua ossigenata 50%
Argento ionico
Stabilizzanti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Leggero
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

NON MISCIBILE
Rameici, Organici, Chelati

MISCIBILE
Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg (box 12 pz)
Fustino	12 kg
Fustino	35 kg
Fusto	220 kg
Cisterna	1100 kg

- Mantiene il livello di sanità ideale all'interno delle serre garantendo un'ottima qualità delle acque di irrigazione
- Additivato alle acque di processo evita che eventuali focolai di patogeni possano diffondersi
- Agisce in velocemente decontaminando e disgregando il biofilm organico
- L'uso costante aiuta a mantenere le piante e l'ambiente in condizioni ottimali di salute
- Impedisce la formazione di alghe negli impianti, negli alveoli, sui vasi , nelle vasche
- Decontamina acque stantie di pozzi e vasche
- Ossigena le radici favorendone lo sviluppo e l'assimilazione dei nutrienti

Le capacità sanificanti del prodotto soddisfato i seguenti metodi

Battericida: EN1276, EN13697, EN1656, EN13727, EN14561, EN14349, EN16437, EN13626, AFNOR NF T 72-281, EN14348, AFNOR NF T 72-281, EN14204

Fungicida: EN1650, EN13697, EN1657, EN13624, EN14562, EN16438, AFNOR NF T 72-281

Virucida: EN EN14476, AFNOR NF T 72-281, EN14675

Sporocidia: EN13704, AFNOR NF T 72-281

Stabilizzato in ARGENTO IONICO

Flusso e riflusso aggiungere ogni 10 -15 giorni 200 cc per ogni m^3 di soluzione. In emergenza per problemi radicali 1 litro per 1 m^3 .

In continuo nelle acque di irrigazione/fertirrigazione 50 / 100 cc per 1 m^3 di acqua.

Talee e bulbi al trapianto 100 cc in 100 litri di acqua immergere per 1 minuto.

Lavaggio semi 50 cc in 1 m^3 di acqua immergere per 10 minuti, quindi lasciare asciugare

Su superfici 100 - 200 cc in 100 litri di acqua anche a contatto con le piante.

Sensibile riduzione nell'uso dei FITOFARMACI

Fitokem

POTENZIATO α-TERPINEOLO e TERPENI

STERICID®

SANIFICANTE / DECONTAMINANTE / DETERGENTE SPECIALE PER SERRE ED ATTREZZATURE

Nuova formula con azione su parassiti e uova

TESTATO con un livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-3}

- Rimozione sicura e veloce del microfilm organico e con esso batteri, funghi, spore, virus, conidi, muffe.
- Attivo su batteri (gram + e gram -)
- Attivo su funghi
- Attivo su spore
- Attivo su virus
- Può essere applicato in presenza di piante. Non è fitotossico.
- Attivo sulle membrane degli ovisacchi
- Azione disabituante per i parassiti
- Interferisce con l'attività trofica dei parassiti
- Tempi di contatto brevissimi
- Non corrode i materiali, non gassifica
- Sicuro per l'operatore
- Non favorisce sviluppi ceppo resistenti
- Effetto residuale al 2% oltre 60 giorni
- Azione sanificante anche nelle acque di irrigazione
- No risciacquo

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzatore, lancia, barre,

COMPOSIZIONE

Acido benzoico
Aldeide glutarica
Quaternari d'ammonio
Biguanide
Terpeni
Tensioattivi

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Arancio
pH	2,5+/- 0,5
Densità	0,9 +/- 0,5
Odore	Balsamico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

ALGA STOP
FUSARID
PROTOGEN

CONFEZIONI

Fustino	10 Lt
Fustino	32 Lt
Fusto	210 Lt
Cisterna	1000 Lt

- Campate, Pavimenti—Passatoie (1-2%)
- Vetri e plastiche (1-2%)
- Bancali—Bancali flusso e riflusso (1-2%)
- Teli sub-irriganti (1-2%)
- Vasi plastica / coccio, seminiere (2%)
- Carrelli, riempitrici, invasatrici (1%)
- Celle frigo , banconi (0,5%)
- Coltelli, forbici, attrezzi da taleaggio (0,3%)
- Vasche, impianti di irrigazione (0,5%)
- Stivali e scarponcini (1%)
- Contenitori / Bins / Cassette (1%)
- Materiale da laboratorio, vetreria (0,5%)
- Lavaggio bulbi (0,3-0,5%) contatto 10 minuti
- Sanificazione flusso e riflusso 100 cc per 1000 Lt. Dose d'urto 1,5lt per 1000 Lt.
- Uso costante in acqua 80/100 cc per 1000 litri





In caso di contatto diretto con piante non superare la dose di 150 cc per 100 lt

Fitokem

DIFESA vs PARASSITI

CORROBORANTI

INSETTICIDI

LOTTA BIOLOGICA

BIO ACTIVE®

POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI

Prodotto a base di OLIO ESSENZIALE DI AGLIO estratto a freddo ed estratti vegetali

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Olio di AGLIO
Estratti vegetali
Oli vegetali naturali

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Aromatico
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'

Fitofarmaci, Insetticidi.
PISTER, BIO STORM, NEEMIL ,
BIO MIX, PIRETRO NATURA

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt

- Applicazione in qualsiasi stadio della pianta e qualsiasi stagione
- Idoneo per qualsiasi tipo di coltivazione
- Emulsione stabile e facilmente miscelabile
- Azione meccanica filmante evita lo scambio gassoso tra le uova (embrioni) e l'atmosfera
- Azione asfissiante sugli adulti
- Non fitotossico
- Zero tempi di carenza
- Atossico per l'uomo ed animali a sangue caldo
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Cocciniglie
- Afidi
- Tripidi
- Aleurodidi
- Oziorinco
- Nuttue
- Acari
- Cicaline
- Eriofidi (acari)
- Metcalfa
- Psylla
- Minatori
- Ragnetto rosso
- Tuta absoluta
- Uova di lepidotteri e coleotteri

ORTICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 200 - 400 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 200 - 300 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO
dosare 2-3 litri / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 15 giorni

Come coadiuvante per altri trattamenti 100 ml / hl

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

BIO MIX®

CORROBORANTE POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI

Prodotto a base di OLIO DI SOIA GREZZO estratto a freddo ed estratti vegetali

DM 6793 del 18/7/2018

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Corroborante

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Olio di soia 50%
Estratti vegetali (quassine, allicine)
Oli vegetali naturali

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Aromatico
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'

Fitofarmaci, Insetticidi.
PISTER, BIO STORM, NEEMIL , BIO ACTIVE, PIRETRO NATURA

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt

- Applicazione in qualsiasi stadio della pianta e qualsiasi stagione
- Idoneo per qualsiasi tipo di coltivazione
- Emulsione stabile e facilmente miscelabile
- Azione meccanica filmante evita lo scambio gassoso tra le uova (embrioni) e l'atmosfera
- Azione asfissiante sugli adulti
- Non fitotossico
- Zero tempi di carenza
- Atossico per l'uomo ed animali a sangue caldo
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Cocciniglie
- Afidi
- Tripidi
- Aleurodidi
- Oziorinco
- Nuttue
- Acari
- Cicaline
- Eriofidi (acari)
- Metcalfa
- Psylla
- Minatori
- Ragnetto rosso
- Tuta absoluta
- Uova di lepidotteri e coleotteri

ORTICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 500 - 600 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 400 - 500 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO
dosare 5-6 litri / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 15 giorni

Come coadiuvante per altri trattamenti 300 ml / hl

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

BIO NUTRIC®

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE NON COMPOSTATO

Azoto (N) organico sul secco 2,3%
Carbonio (C) organico sul secco 47%
Umidità .....29 %
pH 7,8
Contenuto in torba sul tal quale: .....assente
Salinità .....10 dS/m

NEEM

+

PUNGAM

+

AGLIO

La somministrazione di BIO NUTRIC regola le fasi vegetative, aiutando e proteggendo l'apparato radicale e la pianta da stress biotici ed abiotici. Favorisce un ottimale sviluppo della pianta con radici forti, copiose fioriture ed eccellenti fruttificazioni.

CULTURE	DOSI
RISO	500 Kg /ha
GRANO	600 Kg /ha
SOIA	1000 Kg /ha
TABACCO	750 Kg /ha
PATATE	1000 Kg /ha
MELO - PERO - PESCO - KIWI - VITE	1000 Kg /ha
ORTICOLTURA CAMPO / SERRA	1000 Kg /ha
SOLANACEE - CUCURBITACEE	750 / 1000 Kg /ha
ORNAMENTALI	70 Gr / pianta
PIANTE IN VASO	50 Gr / pianta

FORMULAZIONE

Pellet

INQUADRAMENTO

Ammendante

APPLICAZIONE

Spaglio, granulatore

COMPOSIZIONE

Materiali vegetali non fermentati e non trattati chimicamente dopo l'abbattimento

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	n.p
Densità	n.p.
Odore	Organico
Solubilità H_2O	n.p

MISCIBILITA'

Non pertinente

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

BIO ORANGE®

CORROBORANTE POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI

Prodotto a base di OLI estratti a freddo ed estratti vegetali (AGRUMI)

DM 6793 del 18/7/2018

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Corroborante

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Olio di soia 50%
Estratti vegetali
Oli vegetali naturali

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Aromatico
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'

Fitofarmaci, Insetticidi.
PISTER, BIO STORM, NEEMIL ,
BIO ACTIVE, PIRETRO NATURA

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt

- Applicazione in qualsiasi stadio della pianta e qualsiasi stagione
- Idoneo per qualsiasi tipo di coltivazione
- Emulsione stabile e facilmente miscelabile
- Azione meccanica filmante evita lo scambio gassoso tra le uova (embrioni) e l'atmosfera
- Azione asfissiante sugli adulti
- Non fitotossico
- Zero tempi di carenza
- Atossico per l'uomo ed animali a sangue caldo
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Afidi
- Tripidi
- Aleurodidi
- Cicaline

ORTICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 500 - 600 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 400 - 500 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO
dosare 5-6 litri / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 15 giorni

Come coadiuvante per altri trattamenti 300 ml / hl

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

BIO STORM®

CORROBORANTE POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI

Prodotto a base di OLIO DI SOIA GREZZO estratto a freddo ed estratti vegetali

DM 6793 del 18/7/2018

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Corroborante

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Olio di soia 50%
Estratti vegetali ,
Oli vegetali naturali

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Aromatico
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'

Fitofarmaci, Insetticidi.
PISTER, BIO MIX NEEMIL , BIO ACTIVE, PIRETRO NATURA

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt

- Applicazione in qualsiasi stadio della pianta e qualsiasi stagione
- Idoneo per qualsiasi tipo di coltivazione
- Emulsione stabile e facilmente miscelabile
- Azione meccanica filmante evita lo scambio gassoso tra le uova (embrioni) e l'atmosfera
- Azione asfissiante sugli adulti
- Non fitotossico
- Zero tempi di carenza
- Atossico per l'uomo ed animali a sangue caldo
- NON CONTIENE OGM

ORTICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 400 - 500 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 300 - 400 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO
dosare 4-5 litri / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 15 giorni

Come coadiuvante per altri trattamenti 200 ml / hl

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Cocciniglie
- Afidi
- Tripidi
- Aleurodidi
- Oziorinco
- Nuttue
- Acari
- Cicaline
- Eriofidi (acari)
- Metcalfa
- Psylla
- Minatori
- Ragnetto rosso
- Tuta absoluta
- Uova di lepidotteri e coleotteri

Fitokem

AZIONE MECCANICA

KONTAT®

FILMANTE / ADESIVANTE / PROTETTIVO

AIUTO CONCRETO vs PARASSITI

(polisaccaridi bio 49-50%)

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzazione Fogliare

COMPOSIZIONE

Polisaccaridi di origine biologica

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Limpido/opalesc.
pH	n.d.
Densità	1 +/- 0,01
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Miscibile

MISCIBILITA'

Si consiglia l'uso da solo ma può essere abbinato a trattamenti insetticidi per potenziarne l'azione.

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt - 12 pz x box
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt

- Azione meccanica nei confronti di insetti volanti
- Lascia una leggerissima pellicola appiccicosa
- Inibisce l'attività trofica degli insetti bloccando le attività motorie
- Può essere ripetuto più volte a distanza di 1 o 2 giorni
- Ottimo come preventivo e copertura
- Sicuro per gli operatori
- Non è fitotossico uso in presenza di piante
- Non va in accumulo e non sporca le superfici
- No risciacquo
- Non lascia residui

Crea un ambiente ostile per Afidi - Acari - Aleurodidi

Dosare 150 - 250 cc /100 lt di acqua nebulizzare finemente ed in modo abbondante, avendo cura di coprire tutta l'area interessata.

Preparazione: *in un secchio pulito sciogliere la quantità di prodotto necessaria, controllare che la soluzione sia limpida priva di grumi, quindi aggiungerla alla restante soluzione. Nei periodi freddi aiutarsi con acqua calda.*

Fitokem

ATTIVO 100%

NEEMIL®

OLIO DI NEEM

Non trattato estratto a freddo

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale

COMPOSIZIONE

Glicerolipidi provenienti dalla lavorazione di olii vegetali 90% minimo

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallo / bruno
pH	5,5 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Tipico
Solubilità H_2O	Emulsionabile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt
Fusto	200 lt

- Riportando dalla letteratura le proprietà dell'olio di NEEM: l'olio di NEEM è un olio polivalente ed è utilizzato anche nella produzione di pesticidi, fungicidi e germicidi che lo rende un componente importante per scopi agricoli. I suoi principi attivi inibiscono la crescita di insetti interrompendo il loro ciclo di vita. Tra le sue proprietà si possono elencare: **proprietà antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, antisettiche** e **antifungine**, che rendono il suo utilizzo adatto per la salvaguardia di piante dagli attacchi da parte dei parassiti.

- Ottenuto per spremitura a freddo
- EMULSIONABILE
- NON DENATURATO
- OLIO GREZZO NON TRATTATO

Composizione tipica olio di NEEM non trattato

ANALISI	NORMA	RISCONTRO
AZOTO	1 – 2 %	1,40 %
FOSFORO	60 – 80 ppm	71 ppm
POTASSIO	10 - 20 ppm	13 ppm
RAME	8 - 16 ppm	10 ppm
ZINCO	15 – 40 ppm	22 ppm
AZADIRACHTINA	1500 – 3500 ppm	2550 ppm
MAGNESIO	0,10 – 0,50 ppm	0,34 ppm
ACIDO ALFA LINOLEICO	0,20 – 0,70 %	0,38%
ACIDO OLEICO	50 – 70 %	57%
ACIDO STERAICO	10 – 25%	15,10%
ACIDO LINOLEICO	0,5 - 20%	9,22%
ACIDO PALMATICO	10 -25%	14,70%
SALANNINE	5000 -7000 ppm	6100 ppm
NIMBININE	3500 -5000 ppm	4260 ppm

Il prodotto è emulsionabile in acqua.

Su superfici distribuire 1-2 litri di prodotto per 1000 m^2

In acqua dosare 300 / 500 ml per 100 litri

In continuo 0,05 ml per $1m^2$

Fitokem

INSETTICIDA BIOLOGICO

PIRETRO NATURA

INSETTICIDA LIQUIDO A BASE DI PIRETRO NATURALE

PIRETRINE NATURALI 40 gr litro

Meccanismo d'azione IRAC 3A ampio spettro d'azione
Registrazione n. 10560 del 01/08/2000

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Insetticida

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale

COMPOSIZIONE

Piretrine naturali 4,27g (=40g/l)

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1+/- 0,2
Odore	Leggero
Solubilità H_2O	Emulsionabile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi.

Non miscibile con prodotti a reazione alcalina

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg

insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretro naturale 4% in supporto liquido di origine vegetale. Agisce prevalentemente per contatto ed è caratterizzato da una rapida e buona efficacia nel controllare numerosi parassiti su diverse colture agrarie, sia in pieno campo che in serra, in tutte le stagioni. La sua breve persistenza lo rende ideale per l'utilizzo in prossimità del lancio di insetti utili. Il prodotto è consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica e nell'impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza

Intervenire alla comparsa delle infestazioni impiegando attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione. Per aumentare notevolmente l'efficacia del prodotto si consiglia l'abbinamento con BIO MIX o PISTER. I trattamenti devono essere eseguiti possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Per la massima efficacia, utilizzare acqua con pH 6-6,5 e comunque non superiore a pH 7, altrimenti usare un prodotto tampone. Il prodotto è miscibile con i più comuni fertilizzanti fogliari mentre non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (es: Calce, Poltiglia bordolese alcalina, Polisolfuri).

Drupacee (pesche, nettarine, percoche, albicocche, susine, ciliegie)	Afidi	75-90 ml/hl
Vite (da tavola e da vino)	Cicaline, Scafoideo della vite	75-90 ml/hl
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e in serra)	Aleurodidi	75-90 ml/hl
Cetriolo, Zucchino (in pieno campo e in serra)	Aleurodidi	75-90 ml/hl
Melone, Zucca, Cocomero (in pieno campo e in serra)	Aleurodidi	75-90 ml/hl
Lattughe e altre insalate, compresi i prodotti baby leaf (in pieno campo e in serra)	Afidi	75-90 ml/hl

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

PISTER®

CORROBORANTE POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI

Prodotto a base di SAPONE MOLLE DI POTASSIO

DM 6793 del 18/7/2018

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Corroborante

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Acidi grassi, cocco, Sali potassici 40-45%

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	10,5 +/- 0,5
Densità	1,02+/- 0,02
Odore	Nessuno
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'

Fitofarmaci, Insetticidi.
BIO MIX, BIO STORM, NEEMIL,

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt box 12 pz
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt
Fustino	32 lt

- Applicazione in qualsiasi stadio della pianta e qualsiasi stagione
- Idoneo per qualsiasi tipo di coltivazione
- Azione disgregante nei confronti delle melate
- Azione meccanica filmante evita lo scambio gassoso tra le uova (embrioni) e l'atmosfera
- Azione asfissiante sugli adulti
- Non fitotossico
- Zero tempi di carenza
- Atossico per l'uomo ed animali a sangue caldo
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Cocciniglie
- Afidi
- Aleurodidi
- Acari
- Cicaline
- Eriofidi (acari)
- Psylla
- Ragnetto rosso
- Tuta absoluta

ORTICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)

dosare 500 - 600 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)

dosare 400 - 500 ml/1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO

dosare 5-6 litri / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 15 giorni

Come coadiuvante per altri trattamenti 300 ml / hl

Fitokem

AZIONE MECCANICA

TAMIKO®

FILMANTE / ADESIVANTE / PROTETTIVO

AIUTO CONCRETO vs PARASSITI

- Azione meccanica nei confronti di insetti volanti
- Lascia una leggerissima pellicola appiccicosa attiva per poche ore
- Inibisce l'attività trofica degli insetti bloccando le attività motorie
- Può essere ripetuto più volte a distanza di 1 o 2 giorni
- Ottimo come preventivo e copertura
- Sicuro per gli operatori
- Non è fitotossico uso in presenza di piante
- Non va in accumulo e non sporca le superfici
- No risciacquo
- Non lascia residui NON SPORCA

Crea un ambiente ostile per Afidi - Acari - Aleurodidi

Dosare 500 - 800 cc /100 lt di acqua nebulizzare finemente ed in modo abbondante, avendo cura di coprire tutta l'area interessata.

Preparazione: *in un secchio pulito sciogliere la quantità di prodotto necessaria, controllare che la soluzione sia limpida priva di grumi, quindi aggiungerla alla restante soluzione. Nei periodi freddi aiutarsi con acqua calda.*

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzazione Fogliare

COMPOSIZIONE

Polimero acrilico

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Limpido/opalesc.
pH	n.d.
Densità	1 +/- 0,01
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Miscibile

MISCIBILITA'

Si consiglia l'uso da solo ma può essere abbinato a trattamenti insetticidi per potenziarne l'azione.

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt - 12 pz x box
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt

Fitokem

AZIONE MECCANICA

SILKILL®

FILMANTE / ADESIVANTE / PROTETTIVO

Silicone Polimerico

AIUTO CONCRETO vs PARASSITI

- Azione meccanica nei confronti di insetti volanti e striscianti
- Lascia una leggerissima pellicola che asciuga in breve tempo
- Inibisce l'attività trofica degli insetti bloccando le attività motorie
- Può essere ripetuto più volte a distanza di 7/10 giorni
- Ottimo come preventivo e copertura
- Sicuro per gli operatori
- Non è fitotossico in presenza di piante
- Non va in accumulo e non sporca le superfici
- No risciacquo
- Non lascia residui NON SPORCA

Crea un ambiente ostile per qualsiasi tipo di insetto

Su frutteti e piante da esterno 100/200 ml per 100 litri di acqua.

Su floreali anche con fiori 80/100 ml per 100 litri di acqua

Distribuire finemente ed in maniera uniforme sulla superficie interessata

Attenzione :

per una uso corretto si consigliano applicazioni con temperature > 16°C e su superfici perfettamente asciutte.

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzazione Fogliare

COMPOSIZIONE

Silicone polimerico

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Limpido/opalesc.
pH	n.d.
Densità	1 +/- 0,01
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Emulsionabile

MISCIBILITA'

Si consiglia l'uso da solo ma può essere abbinato a trattamenti insetticidi per potenziarne l'azione.

CLASSIFICAZIONE

Nessuna

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt - 12 pz x box
Fustino	5 lt
Fustino	10 lt

Fitokem

MICRORGANISMI

vs PATOGENI

vs PARASSITI

RADICI FORTI

BIG ROOT®

Micorrize Glomus mosseae, Glomus intraradices

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Micorrize.....3 %

Trichoderma .....$1x10^6$ (2 ceppi) (UFC/gr)

Altri batteri della rizosfera .....$1x10^6$ (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

- Forte azione stimolante radicale
- Inoculi micorrizici arbuscolari e batteri PGPR
- Aiuta la fissazione dell'azoto e del Fosforo
- Forte potere di germinazione
- Elevata resistenza alla temperatura e siccità
- Elevata sporulazione
- NON CONTIENE OGM

MISCELATO AL TERRICCIO dosare 250 grammi / m^3 di terriccio.

PIANTINE AL TRAPIANTO O TRAVASO preparazione di una soluzione viscosa ed immergere le radici. Oppure preparare una soluzione fluida e distribuirla sui plateaux.

ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA) dosare 300 gr / 1000 m^2

ORTICOLE IN CAMPO dosare 3-5 Kg / ha

ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO dosare 2 - 3 kg / ha

ALBERI A DIMORA, PORTAINNESTI, BARBATELLE Bagnare le radici con una soluzione di 30-50 gr / 100 litri di acqua.

SISTEMI FLUSSO E RIFLUSSO 50 gr / m^3 di acqua

PRATI E TAPPETI ERBOSI 300 gr / 1000 m^2

Preparare la soluzione aggiungendo NUTRIS applicare dopo 15/20 minuti

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
5—10 °C	20—30 °C	35—40 °C	5—8	una buona umidità ambientale

FORMULAZIONE

Polvere WP

INQUADRAMENTO

Inoculo funghi micorrizici

APPLICAZIONE

Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ammendante vegetale semplice non compostato
Micorrize 5 %
Trichoderma $1x10^6$
Altri batteri $1x10^6$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Biancastro
pH	n.p.
Densità	n.p
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. TRIXO, LEKAN, SERAMYL, RADI-FAST PGPR, BONAMET

CONFEZIONI

Barattolo 1 kg
Barattolo 3 kg

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

BONAMET®

Beauveria bassiana + Metarhizum anisopliae

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Micorrize.....1%

Beauveria bassiana .....$1x10^9$ (2 ceppi) (UFC/gr)

Metarhizum anisopliae .....$1x10^9$ (2 ceppi) (UFC/gr)

Altri batteri della rizosfera .....$1x10^7$ (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Inoculo micorrizico

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ammendante vegetale semplice non compostato
Micorrize 1%
Beauveria $1x10^9$
Metarhizum $1x10^9$
Altri batteri $1x10^7$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Verde / giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. TRIXO, LEKAN, SERAMYL, RADI-FAST PGPR, BIG ROOT

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

- Azione endofita, produzione di metaboliti
- Alta sporulazione
- Lisi della chitina
- Produzione di metaboliti
- Elevata resistenza alla temperatura e siccità
- Attivo sia fogliare che radicale
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Coleotteri
- Dorifora
- Cydia pomella
- Processionaria
- Piralide del Mais
- Afidi
- Aleurodidi
- Cocciniglie
- Tingidi
- Tripidi
- Oziorinco
- Nuttue
- Dorifora
- Attivo anche sulla Zanzara Tigre e Pentatomidi (cimice)

CONCIA DI TORBA ED INERTI dosare 50 - 100 ml / m^3, preparare una soluzione ed inumidire.

PIANTINE AL TRAPIANTO O TRAVASO prima bagnatura 100 ml / hl

IMMERSIONE DELLE RADICI 100 ml / hl di acqua

ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA) dosare 200 - 300 ml / 1000 m^2 ripetere ogni 10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO dosare 2 - 3 litri / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 20 giorni

ALBERI A DIMORA, PORTAINNESTI, BARBATELLE Bagnare le radici con una soluzione di 20-30 ml / 100 litri di acqua.

FLUSSO E RIFLUSSO 30 ml / m^3 di volume ogni 30 gg

Preparare la soluzione aggiungendo NUTRIS applicare dopo 15/20 minuti

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
5—10 °C	20—30 °C	35—40 °C	5—11	una buona umidità ambientale

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

LEKAN®

Lecannicillium

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Micorrize 1%

Lecannicillium muscarium .....$1x10^9$ (UFC/gr)

Lecannicillium lecanii .....$1x10^9$ (UFC/gr)

Altri batteri della rizosfera .....$1x10^7$ (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Inoculo micorrizico

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ammendante vegetale semplice non compostato
Micorrize 1%
Lecanicillium $2x10^9$
Altri batteri $1x10^7$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Verde / giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. BONAMET , SERAMYL, RADI-FAST PGPR, TRIXO, BIG ROOT

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

- Azione endofita
- Alta sporulazione
- Lisi della chitina
- Produzione di metaboliti
- Forte potere di insediamento
- Ottima resistenza
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerosi parassiti:

- Afidi + larve + uova
- Aleurodidi + larve + uova
- Tripidi + larve + uova

ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA) dosare 200 - 300 ml / 1000 m^2 ripetere ogni 7/10 giorni, in emergenza ripetere a 3 giorni

ORTICOLE, FLORICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO dosare 2- 3 Lt / Ha ripetere ogni 7/10 giorni in emergenza ripetere a 3 giorni

Preparare la soluzione aggiungendo NUTRIS applicare dopo 15/20 minuti

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
8—10 °C	25—30 °C	35—40 °C	5—8	Buona umidità ambientale

Fitokem

NUTRIMENTO

NUTRIS®

NUTRIMENTO PER MICRORGANISMI

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Estratti vegetali
Borlanda fluida non estratta con
Sali ammoniacali

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg

Nutrimento appositamente studiato per l'attivazione veloce e sicura dei microrganismi utili.

Aggiunto alla miscela in preparazione, garantisce il giusto apporto di nutrimenti ed equilibrio per l'ottimale sviluppo delle colonie.

Può essere usato anche in aggiunta ai classici trattamenti, al fine di apportare nutrimento ai microrganismi utili già presenti nell'ambiente.

In caso di trattamenti già effettuati, si consiglia l'applicazione per rafforzare le colonie in via di sviluppo, anche a livello fogliare. Ottimo per preparati a base di TRICHODERMA.

MODALITA' D'USO: aggiungere alla miscela la stessa quantità del microrganismo.

Fitokem

VELOCE SVILUPPO

RADIFAST PGPR®

RADICAZIONE E RIPRESA

Streptomyces + Pseudomonas + Bacillus subtillis

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Endomicorrize.....1%
Streptomyces .....$1x10^8$ (2 ceppi) (UFC/gr)
Pseudomonas .....$1x10^8$ (3 ceppi) (UFC/gr)
Bacillus subtilis .....$1x10^8$ (2 ceppi) (UFC/gr)
Altri batteri della rizosfera (Trichoderma)....$1x10^7$ (3 ceppi) (UFC/gr)

- Batteri PGPR (Rizobatteri promotori della crescita delle piante)
- Fissazione dell'azoto atmosferico, il quale è trasferito e organicato nella pianta
- Produzione di siderofili chelanti il ferro reso disponibile per le piante e non per i microrganismi dannosi
- Sintesi di fitormoni che stimolano lo sviluppo delle piante
- Favorisce la proteolisi e ammonizzazione delle sostanze organiche
- Degradazione enzimatica dei composti organici
- Competizione verso i patogeni per i nutrienti o per specifiche nicchie
- Produzione di ormoni biostimolanti per la crescita e l'auto difesa
- Produzione di metaboliti antagonisti nei confronti dei microrganismi dannosi
- Solubilizzazione del fosforo reso più disponibile per le piante attraverso l'aumento di colonizzazione delle radici da parte di batteri e funghi (micorrize)
- Induzione della resistenza sistemica indotta (ISR)
- NON CONTIENE OGM

CONCIA DI TORBA ED INERTI dosare 50 - 100 gr / m^3.
PIANTINE AL TRAPIANTO O TRAVASO prima bagnatura 100 gr/ hl
IMMERSIONE DELLE RADICI 100 gr / hl di acqua
ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)
dosare 150 gr / 1000 m^2 ripetere ogni 20/25 giorni
ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO
dosare 1 - 2 kg / Ha nel volume di acqua di irrigazione ripetere ogni 20/25 giorni
PRATI E TAPPETI ERBOSI 300 gr / 1000 m^2
FLUSSO E RIFLUSSO 50 gr / m^3 di volume ogni 30 gg
Preparare la soluzione aggiungendo NUTRIS applicare dopo 15/20 minuti

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
5—10 °C	20—30 °C	35—40 °C	5—7	una buona umidità ambientale

BIO
RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE
Liquido denso

INQUADRAMENTO
Inoculo Funghi micorrizici

APPLICAZIONE
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE
Inoculo di funghi micorrizici
Batteri della rizosfera $3x10^8$
Trichoderma $1x10^7$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Beige
pH	6,5 +/- 0,1
Densità	n.p.
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'
Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. TRIXO, BONAMET, SERAMYL, LEKAN, BIG ROOT

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

SERAMYL®

Bacillus subtilis + Bacillus amyloliquefaciens

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Endomicorrize 1%

Bacillus subtilis .....$2x10^9$ (2ceppi) (UFC/gr)

Bacillus amyloliquefaciens.....$2x10^9$ (2ceppi) (UFC/gr)

Altri batteri della rizosfera .....$1x10^7$ (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Inoculo Funghi micorrizici

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ammendante vegetale semplice non compostato
Endomicorrize 1%
B. subtilis $1x10^9$
B. amyloliquefaciens $1x10^9$
Altri batteri $1x10^7$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

- Competizione per nutrienti e per lo spazio
- Stimolo delle difese naturali (S.A.R.)
- Produzione di metaboliti
- Ottimo preventivo
- Forte potere di insediamento
- Ottima resistenza
- NON CONTIENE OGM

E' in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Fusarium sp
- Pythium sp
- Graminearum sp
- Xantomonas xp
- Burkoldera sp
- Botrite
- Erwinia
- Pseudomonas syringae
- Sclerotinia
- Peronospora
- Monilia

CONCIA DI TORBA ED INERTI dosare 50 - 100 ml / m^3, preparare una soluzione ed inumidire.

PIANTINE AL TRAPIANTO O TRAVASO prima bagnatura 100 ml / hl

IMMERSIONE DELLE RADICI 100 ml / hl di acqua

ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)

FOGLIARE / RADICALE dosare 200 - 300 ml / 1000 m^2 ripetere ogni 7-10 giorni

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO

FOGLIARE dosare 1-1,5 litri / Ha nel volume di acqua ripetere ogni 20/25 giorni

RADICALE dosare 2-3 litri / Ha nel volume di acqua ripetere ogni 20/25 giorni

ALBERI A DIMORA, PORTAINNESTI, BARBATELLE Bagnare le radici con una soluzione di 20-30 ml / 100 litri di acqua.

FLUSSO E RIFLUSSO 30 ml / m^3 di volume ogni 30 gg

Preparare la soluzione aggiungendo NUTRIS applicare dopo 15/20 minuti

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
8—10 °C	25—30 °C	> 40 °C	5—8,5	Buon grado di umidità

Fitokem

VELOCE SVILUPPO

STARTING PGPR®

CONCIA PER TERRICCI E TORBE

PROTEZIONE E SVILUPPO DI SEMI E GIOVANI PIANTE

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Endomicorrize.....1%
Streptomyces .....$1x10^8$ (2 ceppi) (UFC/gr)
Pseudomonas .....$1x10^8$ (3 ceppi) (UFC/gr)
Bacillus subtilis .....$1x10^8$ (2 ceppi) (UFC/gr)
Trichoderma .....$1x10^8$ (3 ceppi) (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Granuli

INQUADRAMENTO

Inoculo Funghi micorrizici

APPLICAZIONE

Granulatore
Spaglio

COMPOSIZIONE

Inoculo di funghi micorrizici
Batteri della rizosfera $3x10^8$
Trichoderma $1x10^8$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Beige –marrone
pH	n.p.
Densità	n.p.
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi.

TRIXO, BONAMET, SERAMYL, LEKAN

CONFEZIONI

Barattolo 1 kg box 12 pz
Barattolo 3 kg

- Batteri PGPR (Rizobatteri promotori della crescita delle piante)
- Radicazione veloce e forte
- Favorisce l'acclimatamento post-trapianto
- Sintesi di fitormoni che stimolano lo sviluppo delle piante
- Favorisce la proteolisi e ammonizzazione delle sostanze organiche
- Degradazione enzimatica dei composti organici presenti nelle torbe
- Competizione verso i patogeni per i nutrienti o per specifiche nicchie
- Produzione di ormoni biostimolanti per la crescita e l'auto difesa
- Favorisce l'assimilazione del fosforo
- Produzione di metaboliti antagonisti nei confronti dei microrganismi dannosi
- Induzione della resistenza sistemica indotta (ISR)
- NON CONTIENE OGM
- RESISTENTE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE

CONCIA DI TORBA ED INERTI

dosare 500 - 1000 gr / m^3.

PRATI E TAPPETI ERBOSI 300 gr / 1000 m^2

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
5—10 °C	20—30 °C	35—40 °C	5—7	una buona umidità ambientale

Fitokem

LOTTA BIOLOGICA

TRIXO®

Trichoderma (miscela)

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Micorrize.....1% (2 tipi)
Trichoderma harziaunum .....$1x10^9$ (2 ceppi) (UFC/gr)
Trichoderma asperellum .....$1x10^9$ (3 ceppi) (UFC/gr)
Trichoderma atroviride .....$1x10^9$ (3 ceppi) (UFC/gr)
Altri batteri della rizosfera .....$1x10^7$ (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Inoculo Funghi micorrizici

APPLICAZIONE

Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ammendante vegetale semplice non compostato
Micorrize 1%
Trichoderma $3x10^9$
Altri batteri $1x10^7$

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Verde / giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi.

BONAMET, LEKAN, SERAMYL. RADIFAST PGPR

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg	box 12 pz
Fustino	5 kg	
Fustino	10 kg	

- Protezione radicale 3 azioni:
  1) ANTAGONISMO FISICO (occupazione degli spazi, competizione per i nutrienti)
  2) Produzione di sostanze ABIOTICHE (secrezione di metaboliti)
  3) MICOPARASSITISMO cresce sugli altri funghi
- Partecipa al ciclo dell'azoto
- Azione enzimatica su cellulosa e lignina (rende disponibili gli zuccheri)
- Favorisce la proteolisi e ammonizzazione delle sostanze organiche
- Favorisce lo sviluppo radicale e vegetativo
- Rivitalizza terreni asfittici o stanchi
- NON CONTIENE OGM

TRIXO è in grado si aiutare le piante contro l'attacco di numerose avversità quali:

- Rhizoctonia solani
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticilium dahliae
- Thielaviopsis basicola
- Phitophtora capsici
- Fusarium sp
- Pythium sp
- Pirenochaeta sp
- Armillaria
- Rosellinia
- Mal dell'esca
- Ascochyta

CONCIA DI TORBA ED INERTI dosare 50 - 100 ml / m^3, preparare una soluzione ed inumidire.
TRAPIANTO O TRAVASO prima bagnatura 100 ml / hl
IMMERSIONE DELLE RADICI 100 ml / hl di acqua
ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA) dosare 200 - 300 ml / 1000 m^2 ripetere ogni 20/25 giorni
ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO dosare 1 - 2 litri / Ha nel di irrigazione ripetere ogni 20/25 giorni
ALBERI A DIMORA, PORTAINNESTI, BARBATELLE Bagnare le radici con una soluzione di 20-30 ml / 100 litri di acqua.
PRATI E TAPPETI ERBOSI 300 gr / 1000 m^2
FLUSSO E RIFLUSSO 30 ml / m^3 di volume ogni 30 gg



Preparare la soluzione aggiungendo NUTRIS applicare dopo 15/20 minuti

T minima °C	T ideale °C	T massima °C	pH ideale	Condizioni favorevoli
5—10 °C	20—30 °C	35—40 °C	5—11	una buona umidità ambientale

Fitokem

BIOSTIMOLANTI

NUTRIZIONE

RAMEICI

BIOSTIMOLANTE

ALADDIN®

FORTE AZIONE STIMOLANTE

CONCIME ORGANO MINERALE

NPK in sospensione con Microelementi +C ..... 2-9-7 +7
Azoto (N) totale 2%
Azoto (N) organico 0,6%
Azoto (N) ureico 1,0%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale (solubile negli acidi minerali) 9%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua da acido ortofosforico ..5,0%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua 7%
Manganese (Mn) solubile in acqua 2,5%
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,05%
Boro (B) solubile in acqua 0,05%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con [o,o] EDDHA 0,1%
Carbonio (C) organico di origine biologica 7%

- Superamento degli stress Biotici ed Abiotici
- Ripresa radicale e vegetativa
- Allungamento delle radici laterali
- Veloce crescita dei tessuti meristematici
- Miglior assorbimento dei nutrimenti
- Rivitalizza terreni asfittici o stanchi
- Forte sintesi proteica
- Effetto estetico
- Aumento dell'attività fotosintetica
- Stimolo alla produzione di auxine
- Forte vigore delle funzioni enzimatiche
- Rigogliose fioriture
- Maggior produzione di polline
- Maggiore allegagione

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Amminoacidi liberi
Fosforo
Potassio
Boro
Ferro
Manganese

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

ALBERI DA FRUTTO Viti, agrumi, pomacee, actinidia, ecc.	CAMPO 5-10 kg / ha VASO 100-200 gr / hl	Minimo due trattamenti trapianto e ripresa vegetativa
ORTICOLE Pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, ecc.	CAMPO 3 -5 kg / ha SERRA 300 gr / 1000 m^2	Minimo due trattamenti trapianto e 10-15 giorno dopo
INSALATE Invidia, lattuga, spinacio, rucola ecc..	CAMPO 3 - 5 kg / ha SERRA 300 gr / 1000 m^2	Al trapianto/post semina 10-12 giorno dopo . Al taglio metà dose
FRAGOLA	CAMPO 3-5 kg / ha SERRA 300 kg / 1000 m^2	Al trapianto e dopo 15 giorni
FLORICOLE ED ORNAMENTALI	Fogliare 200-300 ml/hl	Minimo due trattamenti trapianto o rinvaso e 15-20 giorno dopo

Fitokem

PIANTE FORTI

ALGATER®

MISCELA DI ALGHE

CONCIME ORGANICO AZOTATO CONTENETE ALGHE SCURE (35% p/p)

Azoto organico (N) 1% 1%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 6%
BETAINE 0.08%
MANNITOLO 1,4%
Carbonio organico di origine biologica 20%

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Amminoacidi liberi
Fosforo
Polisaccaridi
Manganese
Magnesio
Molibdeno
Zinco
Ferro
Boro
Estratti umici e fulvici
Estratti vegetali di alghe

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

- Miscela di alghe: nodosum ascophyllum; laminaria digitata; ecklonia maxima
- Superamento dello stress da trapianto
- Resistenza alle condizioni avverse, produzione di FITOALESSINE (metaboliti antimicrobici)
- Stimolo alla produzione di auxine (radici laterali, divisione cellule meristematiche, ramificazione dei vasi)
- Sviluppo ed accrescimento radicale
- Veloce crescita dei tessuti meristematici
- Difese endogene, stress biotici (patogeni) e abiotici (caldo, freddo, condizioni avverse)
- Aumenta la sintesi proteica
- Aumento dell'attività fotosintetica
- Aumenta l'assorbimento dei concimi e dei trattamenti
- Forte vigore delle funzioni enzimatiche
- Rigogliose fioriture
- Maggior produzione di polline
- Maggiore allegagione
- Attività anticascola

POMACEE: 1500 g/ha (fogliare)
A punte verdi. Prefioritura. Accrescimento frutti
AGRUMI: 2500 g/ha (fogliare)
Prefioritura. Post allegagione. Accrescimento frutto
BRASSICACEE: 2000 g/ha (fogliare/radicale)
Alla 4° foglia vera. Dopo 2 settimane.
DRUPACEE: 2500 g/ha (fogliare)
A punte rosa/bianche. Scamiciatura. Accrescimento frutto
OLIVO, FRUTTA A GUSCIO: 2500 g/ha (fogliare)
In prefioritura. Allegagione. Accrescimento frutto
ORTICOLE A FRUTTO: 1500 g/ha (radicale)
Dopo il trapianto, trattamenti ogni 2-3 settimane
ORTICOLE A FOGLIA: 1500 g/ha (fogliare/radicale)
Dalla 4° foglia vera intervenire ogni 2 settimane fino in pre-raccolta.
ACTINIDIA: 2500 g/ha (fogliare)
Germogliamento. Accrescimento getti. Prefioritura Allegagione. Accrescimento frutto
(ripetuto ogni 2-3 settimane fino a giugno)
UVA VINO/ TAVOLA: 2500 g/ha (fogliare)
(primi 2-3 trattamenti anche Iin fertirrigazione)
Germogliamento. Formazione grappolino. Prefioritura. Allegagione. Ingrossamento acini. Invaiatura
POMODORO DA INDUSTRIA: 1500 g/ha (radicale)
Dopo il trapianto. Prefioritura. Allegagione.
CAMPI DA GOLF/PRATI: 1500 g/ha (fogliare)
Alla ripresa vegetativa ein seguito ogni 3-4 settimane
FLORICOLTURA: 100 g / hl al trapianto - 150 g/ hl (fogliare) ogni 20 giorni - 1 kg / 1000 m^2 fertirrigazione 10/15 giorni

Fitokem

AZIONE VEICOLANTE

BAGNANT Fe/Zn

BAGNANTE / DISPERDENTE

CONCIME CE

Soluzione di concime a base di Zinco Solfato Zinco (Zn)

solubile in acqua 2%

CONCIME CE

Soluzione di concime a base di Ferro EDTA Ferro (Fe)

solubile in acqua 2%

BIO

RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale

COMPOSIZIONE

Zinco Solfato

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Lattescente
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,1+/- 0,2
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

- Aiuta la dispersione dei principi attivi
- Favorisce un miglior assorbimento dei trattamenti
- Aumenta la bagnabilità dell'acqua
- Elimina l'effetto idrofobico delle superfici fogliari
- Rende omogenee le soluzioni ed i trattamenti
- Garantisce la miglior resa nell'applicazione
- L'azione antischiuma facilita le operazioni di riempimento e preparazione delle botti
- Mantiene in sospensione eventuali molecole non solubili
- Ottimo per soluzioni oleose

DOSARE 100 / 200 cc per ogni 100 litri di soluzione.
In fase di preparazione mescolare costantemente la soluzione

Fitokem

RAFFORZA LE DIFESE

CUPRUMIL®

RAME AD AZIONE TRASLAMINARE

CONCIME CE

CONCIME CE - CONCIME A BASE DI RAME

Rame (Cu) solfato solubile in acqua 10%

1 LITRO DI PRODOTTO = 180 ppm DI IONI LIBERI Cu++

BIO

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Rame solfato pentaidrato
Disperdente
Solubilizzanti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Azzurro / blu
pH	7,2 +/- 0,5
Densità	1,10 +/- 0,2
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'

Fitofarmaci, Insetticidi, Diserbanti

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg
Fustino	32 kg

- Sopperisce alla carenza di rame e di conseguenza alle problematiche di natura fitopatologica che di produttività
- Partecipa ai processi enzimatici
- Garantisce qualità nella produzione
- Veloce veicolazione
- Influisce positivamente nel contenimento di alcune patologie fungine e batteriche
- Speciale formulazione che consente la veloce traslocazione all'interno dei tessuti vegetali
- Ottima copertura
- Dosi ridotte
- Rafforza le difese naturali
- Costi contenuti

Effettuare 2 / 3 trattamenti alla dose di 100 -150 cc per 100 litri di acqua
In caso di necessità con evidenti sintomi di carenza di rame effettuare 2 interventi a distanza di 7 - 10 giorni alla dose di 200 cc per 100 litri di acqua.
Evitare le applicazioni durante la fioritura

Fitokem

ELAVATA BIOATTIVITA'

CUPRUM RED®

RAME OSSIDO

CONCIME CE

CONCIME CE - CONCIME A BASE DI RAME

Rme (Cu) ossido totale 35%

1 LITRO DI PRODOTTO = 620 ppm DI IONI LIBERI Cu++

BIO

FORMULAZIONE

Liquido denso

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale

COMPOSIZIONE

Rame ossido
Rame idrossido
Sospensivanti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Rosso/bruno
pH	n.p.
Densità	1,40 +/- 0,2
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Sospendibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 lt (box 12 pz)
Fustino	6 kg
Fustino	12 kg

- Sopperisce alla carenza di rame e di conseguenza alle problematiche di natura fitopatologica che di produttività
- Partecipa ai processi enzimatici
- Garantisce qualità nella produzione
- Veloce veicolazione
- Influisce positivamente nel contenimento di alcune patologie fungine e batteriche
- Benefici prolungati nel tempo
- Ottima copertura invernale
- Dosi ridotte
- Meno contenitori da smaltire
- Costi contenuti

Aglio, Cipolla, Scalogno: 0,5 l/ha 10 giorni post trapianto, su semina diretta, quando la pianta raggiunge i 15 cm. Ripetere ogni 10-14 giorni. Vol. min. d'acqua: 75-200 l/ha.

Agrumi: massimo di 2 l/ha in post-raccolta. Da non utilizzare quando fiori e frutti sono sulla pianta. Alla ripresa vegetativa 0,5 l/ha . Vol. min. d'acqua: 500-2.000 l/ha.

Carota: 0,25 a 0.5 l/ha in 200 litri d'acqua a 10-15 cm.

Cereali: 0,25 a 0,5 l/ha in 200 litri d'acqua stadio di 2 foglie al secondo nodo rilevabile.

Drupacee: 0,25-0,5 l/ha dopo la raccolta, prima della caduta delle foglie.

Fragola: (pieno campo): 0,5 l/ha trattare prima che inizi la fioritura. Vol. d'acqua: 200-400 l/ha

Lattuga: (pieno campo): 0,5 l/ha 10-14 giorni dopo il trapianto . Vol. min. d'acqua: 200 l/ha.

Melone: (pieno campo): 0,5 l/ha a 4-6 foglie. Vol. d'acqua: 200 l/ha

Olivo: 0,25-0,5 l/ha due o tre applicazioni all'anno tra primavera e fine autunno. Ripetere se necessario. Intervalli di 10-14 giorni tra un'applicazione e l'altra.

Pomacee: 0,5 l/ha dopo la raccolta, prima della caduta delle foglie. Vol.min. d'acqua: 500 l/ha.

Pomodoro: (pieno campo): 0.5 l/ha in 500 litri d'acqua allo stadio di 4-6 foglie (o 30—35 giorni dopo il trapianto).

Riso: 0,5 l/ha ad accestimento. Vol.min. d'acqua: 200 l/ha.

Sedano: 0.5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie.Ripetere dopo 10-14 giorni,se necessario. Vol.min. d'acqua: 200 l/ha.

Soia: 0,2 litri per 20 litri d'acqua (per un massimo di 0,5 l/ha) 30 giorni dopo la completa emergenza. Se necessario, una seconda applicazione (alla stessa dose) può essere fatta in pre fioritura. Vol. min. d'acqua: 20-50 l/ha.

Vite: 0,5 l/ha prima dello stadio di grappoli visibili. Vol. min. d'acqua: 200 l/ha.

Vivai: 0,25 l/ha appena la superficie fogliare consente di intercettare lo spray. Ripetere ad intervalli di 10-14 giorni. Non applicare in fioritura. Al massimo tre applicazioni all'anno per pianta. Interrompere le applicazioni ad un mese dalla raccolta/commercializzazione. Vol. min. d'acqua: 100 -200 l/ha.

Coperture invernali su frutteti 1,5 litri per ha in 1000 lt di acqua

Sul terreno 7 / 10 litri prima della semina o del trapianto

Fitokem

Supporto Tecnico 391 71 56 500 — fitokem@fitokem.com — www.fitokem.com

STOP CLOROSI

FERTIMAX®

FERRO CHELATO 13%

CONCIME CE

Ferro (Fe) solubile in acqua 13%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 13%

- Previene e cura la carenza ferrica
- Completamente solubile
- Applicazioni fogliari e radicali
- Veloce assimilazione
- Stabile nelle miscele con altri elementi Ph 4—8
- Non macchia
- Favorisce la normale fotosintesi
- Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti e degli ortaggi
- Migliora i colori delle piante e dei fiori

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Microgranuli

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ferro da chelato (EDTA)

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	N.P.
Densità	N.P.
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi.

Diserbi

CONFEZIONI

Barattoli da 3 kg
Secchi da 15 kg
Scatole da 25 kg

FOGLIARE

Colture	*Dose gr/hl*	*Indicazioni*
Piante da frutto, Vite e Olivo	100 – 200 g/hl	Dalla rigonfiamento gemme ogni 25 giorni
Orticoltura in serra	50—100 g/hl	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg
Orticoltura in pieno campo	100—150 g/hl	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg
Coltivazioni estensive (mais, cereali)	50—100 g/hl	Durante il ciclo colturale 3 interventi
Colture floricole, ornamentali, vivaio	50– 100 gr/hl	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 20 gg
Aromatiche in vaso	100-150 g/hl	Durante il ciclo colturale ogni 20 giorni

FERTIRRIGAZIONE / RADICALE

Colture	*Unità*	*Dose*	
		Piante piccole	Piante grandi / in caso di clorosi
Piante da frutto, Vite e Olivo	g/pianta	20 - 30	30 - 40
Agrumi		30 - 50	60 - 100
Vivai da frutto ed ornamentali		5 - 10	30 - 50
Fragola e piccoli frutti		0,5 - 1	
Floricole in vaso		0,5 - 3 (in base alla grandezza del vaso)	
Orticole in serra	g/m^2	1 - 2	
Prati, campi sportivi, tappeti erbosi	g/m^2	3 - 4	
Coltivazioni estensive (mais, cereali)	Kg/ha	3 - 5	

L'intervallo dei dosaggi indicato è in funzione della massa vegetativa delle piante, del livello, di gravità della clorosi, della densità e del sistema di coltivazione.

Fitokem

Supporto Tecnico 391 71 56 500 — fitokem@fitokem.com — www.fitokem.com

PIU' PRODUTTIVITA'

FITO N30®

CONCIME AZOTATO MINERALE

Azoto (N) totale 30%
Azoto (N) nitrico 7,5%
Azoto (N) ammoniacale 7,5%
Azoto (N) ureico 15%

- Fornisce azoto totalmente assimilabile
- Azione nutritiva a lungo termine
- Componenti in grado di rallentare il processo di nitrificazione e inibire l'attività dell'ureasi
- Lo Zinco stimola lo sviluppo meristematico
- Lo Zolfo favorisce la biosintesi degli amminoacidi essenziali (metionina e cisteina)
- Migliore tenore proteico
- Migliore massa vegetale
- Miglioramento delle colture
- Ottimo sia fogliare che radicale
- Economico

FORMULAZIONE
Liquida

INQUADRAMENTO
Concime minerale

APPLICAZIONE
Radicale
Fogliare

COMPOSIZIONE
Sali azotati

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallino
pH	7 / 8
Densità	1,25 +/- 0,5
Odore	Leggero
Solubilità H_2O	Solubile

MISCIBILITA'
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Fustino	12 kg
Fustino	35 kg
Fusto	220 kg
Cisterna	1250 kg

FOGLIARE

Colture	*Dose kg/ha*	*Indicazioni*
Cereali	13 – 15	In associazione ai diserbi
	18 - 20	In associazione ai fungicidi / insetticidi
Piante da frutto, Vite e Olivo	4 – 5	Da post-allegagione, ogni 10-12 giorni
Orticoltura in serra	300 – 350 gr/hl	Durante il ciclo colturale
Orticoltura in pieno campo	4 – 5	Durante il ciclo colturale
Colture floricole e ornamentali, vivaio	200 – 250 gr/hl	Durante il ciclo colturale

FERTIRRIGAZIONE

Colture	*Dose kg/ha*	*Indicazioni*
Mais	100 - 120	Dalla 5° foglia, suddividere la dose totale in 3 – 4 interventi settimanali
Piante da frutto, Vite e Olivo	80 - 100	Da caduta petali, suddividere la dose totale in 2 – 3 interventi settimanali
Orticoltura in serra	12 – 15 kg/1000 mq	Durante il ciclo colturale, suddividere la dose totale in 4 – 5 interventi settimanali
Orticoltura in pieno campo	100 - 120	Durante il ciclo colturale, suddividere la dose totale in 3 – 4 interventi settimanali
Colture floricole e ornamentali, vivaio	10 – 12 kg/1000 mq	Durante il ciclo colturale, suddividere la dose totale in 3 – 4 interventi settimanali

Fitokem

Supporto Tecnico 391 71 56 500 — fitokem@fitokem.com — www.fitokem.com

AMMINOACIDI LEVOGIRI

FITOCURE®

BIOSTIMOLANTE

Prodotto ad azione specifica - EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO

Azoto (N) totale 10%
Azoto (N) organico solubile 10%
Carbonio (C) organico di origine biologica 30%
Rapporto C/N 3
Rapporto GLICINA/(PROLINA + IDROSSIPROLINA) = 1,1
Grado di Idrolisi su secco > 330
Amminoacidi liberi > 10% (CATENA CORTA)

- Elevata concentrazione di amminoacidi liberi levogiri a catena corta
- Superamento dello stress da trapianto
- Diminuisce l'accumulo di nitrati nei tessuti vegetali
- Veicolante dei MESO e MICRO ELEMENTI
- Sviluppo ed accrescimento radicale
- Veloce crescita dei tessuti meristematici
- Attiva i trattamenti
- Aumenta la sintesi proteica
- Aumento dell'attività fotosintetica
- Aumenta l'assorbimento dei concimi e dei trattamenti
- Forte vigore delle funzioni enzimatiche
- Rigogliose fioriture
- Maggior produzione di polline
- Maggiore allegagione

ORTICOLE E FLORICOLE IN SERRA (COMPRESA VASETTERIA)

FOGLIARE: Dosare 150/200 ml in 100/200 litri di acqua distribuire per 1000 m^2 ripetere a 15/20 giorni.

RADICALE: Dosare 400 /500 ml ogni 1000 m^2 nel volume di acqua di irrigazione ripetere a 20 giorni.

ORTICOLE ED ALBERI DA FRUTTO IN CAMPO

FOGLIARE: Dosare 2/3 litri in 500/600 litri di acqua distribuire per Ha ripetere a 20 giorni.

RADICALE: Dosare 4/6 litri 1000 m^2 per Ha ripetere a 20 giorni.

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE
Liquida densa

INQUADRAMENTO
Biostimolante

APPLICAZIONE
Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE
Amminoacidi
Epitelio animale

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'
Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	7 kg
Fustino	12 kg
Fustino	35 kg
Fusto	230 kg

Fitokem

SCUDO TERMICO

KIZAN®

BIOSTIMOLANTE - FISIOATTIVATORE

Coadiuvante a base di ALGHE e POLIGLICOLI

- Favorisce l'assorbimento dei nutrienti
- Aumenta lo sviluppo radicale accelerando il metabolismo della pianta
- Favorisce le naturali difese fisiologiche
- Attiva e migliore ed allunga le fasi oscure delle piante
- Ricco di POLIFENOLI fondamentali per il ciclo dell'azoto e come antiossidanti
- Ricco di TOCOFEROLO (vitamina E) per l'allegagione e moltiplicazione cellulare
- Impedisce la traspirazione con conseguente perdita di acqua e nutrienti
- Favorisce l'adattamento agli stress abiotici e biotici
- Aiuta nei momenti di sbalzi termici e eventi climatici particolari (colpi di CALDO/FREDDO)
- Miglior qualità produttiva
- Migliora l'allegagione
- Maggior produzione di polline
- Favorisce l'impollinazione entomofila
- Aumenta ed amplifica le attività dei fitofarmaci ed insetticidi

ORTAGGI IN CAMPO/SERRA

FOGLIARE 1 kg / ha

RADICALE 2-3 kg / ha

Pomodoro - Asparago - Fragola-Melanzana - Peperone - Carciofo

al trapianto e post trapianto ogni 15-20 giorni

FRUTTETI

FOGLIARE 1,5 kg / ha

FRUTTETI

Ciliegio - Olivo - Pero-Pesco-Actinidia

Agrumi -Vite da tavola e da vino

Ogni 15 giorni dalla ripresa vegetativa fino alla pre-fioritura, poi dall'allegagio-

AROMATICHE (campo/serra)

FOGLIARE 1 kg/ha per aspersione ogni 15 giorni e post-cimatura

N.b. il prodotto può essere abbinato con i normali trattamenti fitosanitari o di concimazione

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Biostimolante

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Estratti di alghe

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1+/- 0,05
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg
Fustino	32 kg
Fusto	200 kg

Applicazione come TERMOREGOLATORE

12 ore prima dell'emergenza (brinata) ripetere dopo 24 ore

Dosare il prodotto in base ai gradi di temperatura da sopportare :

- 4 kg per temperature fino a +/- 4°C diluiti in 3/15 ettolitri di acqua
- 5 kg litri per temperature fino a +/- 6°C diluiti in 3/15 ettolitri di acqua
- 6 kg litri per temperature fino a +/- 8°C diluiti in 3/15 ettolitri di acqua

Fitokem

FORTIFICA

MASTER K®

POTASSIO BIOLOGICO

BIO

RESIDUO ZERO

VEGAN

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Radicale
Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Estratti vegetali
Borlanda fluida non estratta con
Sali ammoniacali

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	7 kg
Fustino	12 kg
Fustino	35 kg
Fusto	220 kg

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO BORLANDA FLUIDA

Azoto (N) organico (p/v) 2,6%
Ossido di potassio (K_2O) (p/v) 7,8%
Carbonio (C) organico (p/v) 17%

- Origine vegetale
- Veloce assimilazione
- Attivazione della microflora e microfauna
- Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti e degli ortaggi
- Apporto di amminoacidi e polisaccaridi
- Aumento della resistenza dei tessuti
- Aumento della resistenza passiva
- Completamento delle concimazioni
- Resistenza a stress abiotici

FOGLIARE

Colture	*Dose gr/hl*	*Indicazioni*
Piante da frutto, Vite e Olivo	500 gr/hl	Da pre-fioritura ogni 15 gg
Orticoltura in serra	300 gr/hl	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg
Orticoltura in pieno campo	400 gr/hl	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg
Colture floricole e ornamentali, vivaio	200 gr/hl	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg

FERTIRRIGAZIONE

Colture	*Dose kg/ha*	*Indicazioni*
Piante da frutto, Vite e Olivo	15 kg/Ha	Da pre-fioritura ogni 15 gg
Orticoltura in serra	1 kg/1000 mq	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg
Orticoltura in pieno campo	10 kg/Ha	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg
Colture floricole e ornamentali, vivaio	1 kg/1000 mq	Durante il ciclo colturale con i concimi ogni 15 gg

Fitokem

TRASLOCAZIONE SISTEMICA

ORTEK 30/20®

FOSFITO DI POTASSIO

CONCIME AD AZIONE PROTETTIVA E CURATIVA

CONCIME

Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua 30%

Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua 20%

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Concime

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale

COMPOSIZIONE

Fosfito di potassio

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	2,5 +/- 0,5
Densità	1,40+/- 0,2
Odore	Inodore
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	7 kg
Fustino	14kg
Fustino	35 kg
Fusto	230 kg
Cisterna	1400 kg

- Azione diretta influenzando il meccanismo fosforico del patogeno ed inibendo la sporulazione
- Azione di stimolazione difesa endogena, produzione di Fitoalessine o Proteine Relativete alla Patogenesi (PRP)
- Funzione di protezione e cura soprattutto negli organi verdi e di accrescimento
- Stimolazione della Resistenza Indotta Sistemica (RIS)
- Vengono trasportati sia in senso Acropeto che Basipeto, quindi sia nello Xilema che nel Floema
- Elevata assimilabilità sia fogliare che radicale
- Elevatissime proprietà nutrizionali con conseguente sviluppo radicale/ vegetativo
- 100 grammi di prodotto contengono 46,3 grammi di Fosfito (PO_3)

AGRUMI	Per via fogliare 200-300 ml/hl	Minimo due trattamenti in primavera avanzata ed uno in autunno
FRUTTICOLE	Per via fogliare 200-300 ml/hl	Trattare dalla primavera a cadenza mensile e, ove necessario, in autunno
VITE	Per via fogliare 200-300 ml/hl	Trattamenti ripetuti ogni 15-20 giorni a seconda delle necessità
ORTICOLTURA e FLORICOLTURA	Per via fogliare 200-300 ml/hl	Trattamenti ripetuti ogni 20-30 giorni l'uno dall'altro a seconda delle necessità
FRUTTICOLTURA VITI (barbatelle)	Per via radicale 6-18 litri/hl	Si consiglia di suddividere i dosaggi riportati in due, tre cicli di irrigazione, distanziati di una settimana l'uno dall'altro
ORTICOLTURA e FLORICOLTURA	Per via radicale 6-10 litri/ha	Si consiglia di suddividere i dosaggi riportati in due, tre cicli di irrigazione, distanziati di una settimana l'uno dall'altro
IMMERSIONE DELLE RADICI	1,5 ml/l	Eseguendo l'immersione prima del trapianto
ORTICOLTURA e FLORICOLTURA	Fogliare 300 cc/ha Oppure 2 cc/litro	Ripetere ogni 18/20 giorni

Fitokem

CALCIO

RACAL®

RAPIDA ASSIMILAZIONE

CONCIME MINERALE SEMPLICE

Calcio Carbossilato CaO 13%

- Calcio di pronta assimilazione ed utilizzo da parte della pianta
- Aumenta la SHELF - LIFE di frutta e verdura
- Favorisce il mantenimento dei fiori recisi
- Aumenta le difese naturali delle piante
- Favorisce un miglior sviluppo cellulare e pareti cellulari
- Si veicola velocemente

UTILE CONTRO

- **Spaccatura dei frutti**
- **Disseccamento del rachide della vite**
- **Butteratura amara del melo**
- **Tip-burn su orticole e insalate**
- **Cuore nero di sedano e carota**
- **Marciume apicale**
- **Spaccatura frutti**
- **Bordatura fioricole (poinsettia)**
- **Maculatura degli agrumi**

Colture	*Dose gr/hl*	*Indicazioni*
Piante da frutto, Vite e Olivo	300 - 400 g/hl	Applicare ogni 10 / 15 giorni durante la fase di crescita dei frutti
Orticole da foglia	400 g/hl	Applicare ogni 15 / 20 giorni
Drupacee , pomacee, vite	300 - 400 g/hl	Applicare ogni 15 giorni
Colture floricole, ornamentali, vivaio	350 - 400 gr/hl	Applicare ogni 10 / 12 giorni

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Fogliare
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Calcio carbossilato

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	8 +/- 0,5
Densità	1 +/- 0.05 gr/ml
Odore	Nessuno
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

NON MISCIBILE
Non miscelare con prodotti contenenti solfati o fosfati. Evitare le miscele con zolfo e rame

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg (box 12 pz)
Fustino	10 kg
Fustino	32 kg

Fitokem

BREVI CICLI PRODUTTIVI

RADICOS®

BIOPROMOTORE DI CRESCITA

SVILUPPO VEGETATIVO RADICALE E FOGLIARE

RESIDUO ZERO

- Superamento dello stress da trapianto
- Emissione di nuove radici
- Allungamento delle radici laterali
- Veloce crescita dei tessuti meristematici
- Miglior assorbimento dei nutrimenti
- Rivitalizza terreni asfittici o stanchi
- Forte sintesi proteica
- Rigenerante della microflora (mineralizzazione della sostanza organica)
- Aumento dell'attività fotosintetica
- Stimolo alla produzione di auxine
- Forte vigore delle funzioni enzimatiche
- Rigogliose fioriture
- Maggior produzione di polline
- Maggiore allegagione

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Promotore di sviluppo

APPLICAZIONE

Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Amminoacidi liberi
Fosforo
Polisaccaridi
Manganese
Magnesio
Molibdeno
Zinco
Ferro
Boro
Estratti umici e fulvici
Estratti vegetali di alghe

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	7 kg
Fustino	14 kg

ALBERI DA FRUTTO Viti, agrumi, pomacee, actinidia, ecc.	CAMPO 20-25 kg / ha VASO 300-400 gr / hl	Minimo due trattamenti trapianto e ripresa vegetativa
ORTICOLE Pomodoro, peperone, melanzana,	CAMPO 12 -15 kg / ha SERRA 3-4 kg / 1000 m^2	Minimo due trattamenti trapianto e 10-15 giorno dopo
INSALATE Invidia, lattuga, spinacio, rucola ecc..	CAMPO 12-15 kg / ha SERRA 3 - 4 kg / 1000 m^2	Al trapianto/post semina 10-12 giorno dopo Al taglio metà dose
FRAGOLA	CAMPO 8 -10 kg / ha SERRA 1-2 kg / 1000 m^2	Al trapianto e dopo 15 giorni
FLORICOLE ED ORNAMENTALI	200-300 ml/hl	Minimo due trattamenti trapianto o rinvaso e 15-20 giorno dopo

Ripetere i trattamenti in caso di stress delle colture o necessità

Fitokem

Supporto Tecnico 391 71 56 500 — fitokem@fitokem.com — www.fitokem.com

AZIONE BIOSTIMOLANTE

VITALITY®

AZOTO ORGANICO

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO - CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE
Azoto (N) organico 8,5%
Azoto (N) organico solubile in acqua 8,5%
Carbonio (C) organico 29,5%

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Concime organico

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Carniccio fluido in sospensione
Amminoacidi liberi

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bruno
pH	6,5 +/- 0,5
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Fustino	14kg
Fustino	35 kg
Fusto	220 kg
Cisterna	1280 kg

RADICALE

- Migliora la struttura del terreno
- Aumenta l'assorbimento radicale
- Aumenta l'attività enzimatica
- Resistenza alla salinità
- Rivitalizza terreni asfittici o stanchi
- Favorisce lo sviluppo della microflora

Colture arboree pre-fioritura, allegagione -ingrossamento, invaiatura 5-7 kg/Ha

Orticole in serra 7-9 kg / Ha ogni 15 gg

Orticole in campo 4-6 kg/Ha ogni 15 gg

Floricole in serra 1 kg/ 1000m^2 ogni 20 gg

FOGLIARE

- Aumento dell'attività fotosintetica
- Stimola alla produzione di auxine
- Forte vigore delle funzioni enzimatiche
- Rigogliose fioriture
- Maggior produzione di polline
- Maggiore allegagione

Colture arboree pre-fioritura, allegagione - ingrossamento, invaiatura 300 cc /100 lt

Orticole in serra 300 cc /100 lt ogni 15 gg

Orticole in campo 400 cc/100 lt ogni 15 gg

Floricole in serra 50 cc / 100 lt ogni 20 gg

A seguito di stress biotici/abiotici, intervenire con la dose più alta entro le 48 ore e ripetere dopo 7-10 giorni

AMMINOACIDI LEVOGIRI

PRODOTTO DA IDROLISI ENZIMATICA

Fitokem

AZIONE BIOSTIMOLANTE

ZOLFO 50®

CORRETTIVO

SOSPENSIONE DI ZOLFO IN ACQUA

Zolfo (S) totale (esente da selenio).....50%

BIO RESIDUO ZERO

- Migliora la struttura del terreno
- Stabilizza e solubilizza i microelementi rendendoli disponibili per le piante
- Nutre e corregge il substrato di coltivazione
- Aumenta la qualità e le quantità delle produzioni

Dosi e modalità di impiego (fogliare)	*ml/hl*	*gr/hl*
ALBERI DA FRUTTO	200-250	250-300
VITE	200-250	250-300
OLIVO	250-300	300-400
NOCCIOLO, NOCI E FRUTTI A GUSCIO	150-250	200-300
FRAGOLE , FINOCCHIO, ORTIVE	200-300	250-400
COLTIVAZIONI IN PIENO CAMPO	250-300	300-400
FLORICOLTURA	150-250	200-300

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Concime correttivo

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Zolfo in sospensione

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Giallo
pH (5%)	8,2 +/- 0,2
Densità	1,25+/- 0,2
Odore	Tipico
Solubilità H_2O	Sospendibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Fustino 7 kg
Fustino 14kg
Fustino 35 kg

Fitokem

CORRETTORI PH

MANUTENZIONE

SPECIALITA'

CORRETTORI PH

ACIDIFICANTI SPECIALI PER ACQUE E TERRENI

MATERIE PRIME IN PUREZZA—NON RIGENERATI—ESENTI DA METALLI PESANTI ED AGENTI INQUINANTI

ACIDO CITRICO L

ACIDO CITRICO LIQUIDO AL 30% STABILIZZATO

E' una soluzione a base di acido citrico in purezza di grado alimentare E330. Regolatore acido del pH delle soluzioni sia concimanti che per trattamenti antiparassitari. Impiegato sia fogliare che radicale favorendo l'assorbimento degli elementi nutritivi.

CONFEZIONAMENTO:

Tanica da 12 Kg (60 per pallet)

Tanica da 25 Kg (30 per pallet)

Fusto da 210 Kg (2 per pallet) - Cubo 1100

ACIDO FOSFORICO 75% (53 Bè)

CONCIME CEE

Acido Ortofosforico Concentrato in purezza esente da metalli pesanti.

Anidride fosforica (P_2O_5) da acido ortofosforico p/p 53%. Fosforo (P) solubile in acqua p/p 23,50%

CONFEZIONAMENTO:

Tanica da 25 Kg (30 per pallet)

Fusto da 230 Kg (2 per pallet) - Cubo 1200 Kg

ACIDO CITRICO P

ACIDO CITRICO GRANULARE AL 99%

Acido citrico in purezza di grado alimentare E330. Regolatore acido del pH delle soluzioni sia concimanti che per trattamenti antiparassitari. Può essere impiegato sia fogliare che radicale favorendo l'assorbimento degli elementi nutritivi.

CONFEZIONAMENTO:

Secchio da 12 Kg (60 per pallet)

Secchio da 25 Kg (30 per pallet)

ACIDO FOSOROSO

CONCIME CEE

Acido Ortofosforoso Concentrato in purezza esente da metalli pesanti.

Anidride fosforica (P_2O_5) da acido ortofosforoso p/p 53%. Fosforo (P) solubile in acqua p/p 23,50%

CONFEZIONAMENTO:

Tanica da 25 Kg (30 per pallet)

Fusto da 230 Kg (2 per pallet) - Cubo 1200 Kg

ACIDO SOLFORICO AL 50%

ACIDO SOLFORICO CONCENTRATO

Acido Solforico Concentrato in purezza esente da metalli pesanti.

Tanica da 25 Kg (30 per pallet)

Fusto da 230 Kg (2 per pallet)

Cubo 1200 Kg

ACIDO NITRICO 42 Bè

ACIDO NITRICO CONCENTRATO AL 65%

Acido Nitrico Concentrato in purezza esente da metalli pesanti.

Azoto (N) solubile in acqua p/p 14,5%

CONFEZIONAMENTO:

Tanica da 25 Kg (30 per pallet)

Fusto da 230 Kg (2 per pallet) - Cubo 1200 Kg

TRAPPOLE CROMOTROPICHE

CROMATIC GIALLO - CROMATIC BLU

Trappole cromatiche per il monitoraggio e la cattura di insetti dannosi per le colture, da posizionare nelle serre o in prossimità delle colture da monitorare.

CROMATIC è esente da veleni e pesticidi.

Per il monitoraggio, posizionare 10 fogli di ogni 1000 metri quadri.

Per la cattura in massa, posizionare 10 fogli ogni 100 metri quadri.



SLEEK

FORMULAZIONE

Liquido

COMPOSIZIONE

Siliconi modificati

ASPETTI CHIMICO/ FISICI

Colore	Bianco
pH	n.p.
Densità	1
Odore	Tipico
Solubilità H_2O	n.p.

CONFEZIONI

Fustini	5kg
Fustini	10 kg

BALSAMO LUCIDANTE FOGLIARE

Rende il lavoro di pulizia pre-vendita più facile e veloce, con notevole risparmio di tempo e denaro. Protegge dagli agenti atmosferici la cuticola superiore e l'epidermide inferiore. Blocca l'insorgere dei radicali liberi evitando così l'invecchiamento dell'apparato fogliare. Allontana e protegge da eventuali parassiti come cocciniglie, afidi, pidocchi ecc. Evita il depositarsi del pulviscolo ambientale lasciando la foglia pulita per molto tempo. Favorisce il regolare processo della fotosintesi clorofilliana garantendo una crescita migliore. Prima dell'applicazione si consiglia la pulizia delle piante con una soluzione di **FITOBACTER** (100 cc per 100 litri di acqua) e **BAGNAT** (200 cc per ettolitro di acqua).

MODALITA' D'USO: Dosare il 100-200 cc in 100 litri di acqua

ATTENZIONE UTILIZZARE IL PRODOTTO SOLO SU PIANTE A FOGLIA LUCIDA

NON COLA

GRASSO SERRA

GRASSO PER CREMAGLIERE

ORGANI IN MOVIMENTO

- Facile applicazione pennello o spray
- Garantisce una perfetta scorrevolezza delle cremagliere
- Azione protettiva
- Ottima resistenza all'umidità
- Ottima resistenza alle alte e basse temperature
- Grazie alla sua spiccata caratteristica tixotropica non cola
- Non intacca i materiali
- Non polverizza
- Ottimo per catene di trasmissione
- Ottimo per cuscinetti
- Notevole durata
- Non macchia il materiale sottostante

FORMULAZIONE

Pasta

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

COMPOSIZIONE

Litio
Zinco
Titanio
Untuosanti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bianco
pH	n.p.
Densità	n.p
Odore	Tipico
Solubilità H_2O	n.p.

CONFEZIONI

Secchio 20 kg

Fitokem

AZIONE FILMANTE

LASTING®

FILMANTE / ADESIVANTE PER TRATTAMENTI

Lega con qualsiasi molecola

- Formulato di altissimo grado tecnologico, forma un reticolo elastico che, aderendo sulla superficie trattata, ancora i principi attivi sul supporto aumentando la residualità degli stessi ma lasciando inalterata la naturale traspirazione della superficie.
- Si lega con i principi attivi e formare una pellicola all'esterno rispetto alla superficie, garantendo la massima protezione dagli agenti atmosferici quali piogge e vento
- Favorisce un miglior assorbimento delle molecole
- Aumenta la bagnabilità dell'acqua

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMNETO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

Polimeri acrilici idrosolubili

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Lattescente
pH	n.p
Densità	1,1+/- 0,2
Odore	Leggero
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi. Diserbi

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

Diluire dall' 1 - 2 KG per Ha, in base al grado di protezione necessaria.

Preparare le miscele aggiungendo **LASTING** in ultima fase sotto agitazione, e mantenere l'agitazione anche durante l'applicazione .

Applicare con mezzi manuali o meccanici.

Per una copertura totale si consiglia di irrorare abbondantemente la superficie.

In normali condizioni atmosferiche il prodotto ha una copertura di 50/60 giorni, in caso di forti avversità (forti piogge o grandinate) si consiglia di ripetere l'intervento immediatamente dopo

Ottimo per trattamenti rameici
(**CUPRUM RED, CUPROMIL**) e coperture invernali

Fitokem

TERMOREGOLATORE

SCUDO

OMBREGGIANTE PER SERRE AUTOESTINGUENTE

- Schermante
- Termoregolatore (riflette i raggi UV)
- Fotosensibile (varia in base alla luce)
- Bio degradabile (si decompone in sostanze minerali semplici)
- Auto estinguente (va via con le regolari piogge stagionali)
- Distribuisce in modo uniforme la luce
- Non intacca le superfici
- Idoneo a qualsiasi superfici
- Non altera il pH delle acque piovane
- Asportabile con SCUDO VIA LIQUIDO

FORMULAZIONE

Pasta

COMPOSIZIONE

Ossido di titanio
Resine

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Bianco
pH	n.p.
Densità	1,35 +/- 0,2
Odore	Tipico
Solubilità H_2O	n.p.

CONFEZIONI

Secchio	22 kg
Cisterna	1400



DILUIZIONE IN ACQUA in KG	1 : 6	1 : 5	1 : 4	1 : 3	1 : 2
OMBREGGIATURA %	30-35	40-45	50-55	60-65	70-75

Fitokem

SPECIALE GIARDINO

TAPPETI ERBOSI

ATTREZZATURE

SAL 10^{-6}

GREEN SANO®

RISANANTE PER PRATO E TAPPETO ERBOSO

CONCIME CE - Soluzione di concime a base di Zinco Solfato

Zinco (Zn) solubile in acqua 2%

Risponde a livello SAL (livello di sicurezza di sterilità) superiore a 10^{-6}

Aiuta il prato dallo stress BIOTICI, in particolare:

- FUSARIUM Spp
- PYTHIUM aphanidermatum
- MACCHIA GIALLA (Rhizoctonia cerealis)
- DOLLAR SPOT (Sclerotinia Homeocarpa)
- MARCIUME ROSA INVERNALE (Microdochium

- Ideale per CAMPI DA GOLF, CAMPI DA CALCIO, TAPPETI ERBOSI, PRATI ORNAMENTALI

- Azione sia preventiva che curativa
- Previene la formazione di alghe, mucillaggini e muschio
- Mantiene controllata la microflora patogena nei substrati
- Cauterizza le ferite post-taglio o dopo aver arieggiato
- Disgrega accumuli di concimi e fitofarmaci nel terreno, garantendo sempre un buon equilibrio
- Ossigena il terreno
- Aiuta l'apparato radicale al superamento di stress da ristagni idrici o forti piogge
- Prodotto ecologico senza residui
- In emergenza può essere applicato a distanza di pochi giorni
- Non ha tempo di carenza, il prato è praticabile dopo 3 ore dall'applicazione
- Innocuo per gli esseri umani ed animali

Si consiglia l'applicazione al manto erboso di GREEN SANO dopo forti sollecitazioni tipo incontri di calcio, concerti, ed attività varie, in quanto è in grado di cicatrizzare le lacerazioni ai fili d'erba evitando la penetrazione di malattie e favorendo una veloce e sana ripresa vegetativa

DOSE DI COPERTURA/MANTENIMENTO: Diluire da 50 a 100 cc per 100 litri di acqua, quindi bagnare abbondantemente la superficie, (avere cura che l'acqua di bagnatura penetri fino alla profondità voluta)

DOSE D'URTO PER 100 LITRI D'ACQUA:
Diluire da 200 a 300 cc ogni 100 litri di acqua quindi bagnare abbondantemente la superficie, (avere cura che l'acqua di bagnatura penetri fino alla profondità voluta).

FORMULAZIONE

Liquido

INQUADRAMENTO

Concime ce

APPLICAZIONE

Fogliare
Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Zinco Solfato
Acidi Carbossilici a 1 e 2 atomi di carbonio, Acqua ossigenata, stabilizzante.

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore
pH	1 +/- 0,5
Densità	1,20 +/- 0,5
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

NON MISCIBILE
Rameici, Organici, Chelati

MISCIBILE
Concimi minerali,
Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg (box 12 pz)
Fustino	10 kg
Fustino	25 kg
Fusto	210 kg
Cisterna	1100 kg

Fitokem

EVERGREEN

VERY GREEN®

ELIMINA IL FELTRO DAI TAPPETI ERBOSI

Trichoderma reesei

Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici

Micorrize.....1%

Trichoderma reesei .....1x10^9 (2 ceppi) (UFC/gr)

Altri batteri della rizosfera .....1x10^7 (UFC/gr)

BIO RESIDUO ZERO

FORMULAZIONE

Liquida densa

INQUADRAMENTO

Inoculo micorrizico

APPLICAZIONE

Radicale
Fertirrigazione

COMPOSIZIONE

Ammendante vegetale semplice non compostato
Micorrize 1%
Trichoderma 1x10^9
Altri batteri 1x10^7

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Verde / giallino
pH	6 +/- 0,5
Densità	0,9+/- 0,2
Odore	Organico
Solubilità H_2O	Disperdibile

MISCIBILITA'

Concimi minerali, Concimi organici, Fitofarmaci, Insetticidi.

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg	box 12 pz
Fustino	5 kg	
Fustino	10 kg	

- Degrada ed elimina il FELTRO del prato
- Effetto estetico ridando al prato la sua naturale brillantezza, eliminando velocemente l'antiestetico effetto "fili di paglia"
- Si adatta a qualsiasi tipo di clima ed ambiente
- Azione curativa, evitando che l'accumulo di FELTRO, possa creare cattive condizioni di circolazione di aria, acqua ed umidità, favorendo l'insorgere di malattie
- Azione enzimatica su cellulosa e lignina (rende disponibili gli zuccheri ed i Sali minerali)
- Azione nutritiva, in quanto tutto il materiale degradato e decomposto concimerà il prato
- Favorisce la proteolisi e ammonizzazione delle sostanze organiche
- Evita gravose ore di lavoro

Immediatamente disponibile ed attivo grazie alla sua formulazione liquida, basta diluirlo nel volume d'acqua necessario. Per un migliore sviluppo, aggiungere **NUTRIS** attendere 20/30 minuti affinché si attivi quindi procedere con l'applicazione.
Distribuire 250 ml su una superficie di 500 m^2 . Il prato è immediatamente praticabile.

FITO GREEN può essere applicato in qualsiasi momento ed in qualsiasi periodo dell'anno, per un migliore risultato si consiglia l'uso da Febbraio ad Ottobre, sempre dopo aver operato il taglio (minimo 3 applicazioni)

Fitokem

AZIONE VELOCE

WIDES®

DISGREGANTE DI

MUSCHIO - ALGHE - LICHENI

- Azione protettiva in prevenzione e curativa
- Forma una pellicola protettiva che blocca lo sviluppo di muschio, alghe e licheni
- Agisce velocemente
- Evita il propagarsi di inoculi
- Non danneggia piante o materiali
- Azione duratura (bastano 2/3 trattamenti annuali)
- Di facile applicazione
- BIODEGRADABILE AL 100%
- Le aree trattate sono praticabili appena asciutto
- Ottimo per la rimozione facile e sicura da statue, manufatti, facciate di muschio e licheni

Diluire 150/300 cc di prodotto per 100 litri di acqua. Bagnare abbondantemente la zona interessata. Lasciare agire senza risciacquare. Per la compatibilità con i materiali si consiglia di effettuare una prova preliminare in piccolo.

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Fogliare

COMPOSIZIONE

3,3-metilenbis[metilossazolidina]

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore	Incolore /giallino
pH	9-11
Densità	1,05+/-0,02
Odore	Pungente
Solubilità H_2O	Totale

MISCIBILITA'

Usare il prodotto solo in miscela con acqua

CONFEZIONI

Flaconi	1 kg box 12 pz
Fustino	5 kg
Fustino	10 kg

Fitokem

DOSAMATIC



Pompa dosatrice a dosaggio costante regolabile manualmente, dosaggio proporzionale ad un segnale analogico (0/4-20 mA o 20-4/0 mA) o ad un segnale digitale (contatore lancia impulsi, 1:n o n:1, funzione timer, dosaggio ppm, dosaggio batch, statistiche, password, ingresso ON-OFF (controllo remoto)

Alimentazione 100-230Vac

Corpo pompa: PVDF

Sfere: CERAMICA

Filtro di fondo: PVDF

Valvola di Iniezione: PVDF

Contatore lancia impulsi a getto singolo, quadrante asciutto e lettura a rulli

Sonda di livello completa di staffa

Serbatoio 100 litri graduato in POLIETILENE ALIMENTARE

SCHEMA INSTALLAZIONE



Diametro attacco	Pollici	½″	¾″	1″	1 ¼″	1 ½″	2″	2,5″	3″	4″
Pressione massima	Bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Portata massima	mc/h	3	5	7	10	20	30	55	90	140
Perdita di carico	1 bar									

JET SAN

Pistola per disinfettante

Con dosaggio

GUANTI NITRILE

GUANTI NITRILE ULTRA RESISTENTI

100 Pz x Box

10 Box x Scatola

RADICAZIONE

Prodotti interessati: *RADICOS – RADIFAST PGPR – TRIXO - ORTEK 30/20*

TRAPIANTO

Preparazione al trapianto di talee floricole ed ornamentali "bagno dei plateau"

Preparare in una vasca 100 litri di soluzione contenete:

100 cc TRIXO + 100 cc RADIFAST PGPR + 200 cc RADICOS + 100 cc ORTEK

Immergere il plateau per 10/15 secondi, quindi procedere al rinvaso.

Ripetere il trattamento a 10 giorni post trapianto fertirrigazione con:

25 cc TRIXO + 25 cc RADIFAST PGPR + 50 cc RADICOS + 25 cc ORTEK / 100 lt di acqua

Nel caso in cui non si ritenga necessario l'uso di uno dei 4 prodotti, aumentare le dosi degli altri 3 del 50%.

Distribuzione con Dosatron al 1%: soluzione madre 9 litri di acqua con

250 cc TRIXO + 250 cc RADIFAST PGPR + 500 cc RADICOS + 250 cc ORTEK

SEMINA FLORICOLE/ORTICOLE

A 3 giorni dalla semina (o immediatamente dopo la germinazione) fertirrigazione con:

10 cc TRIXO + 10 cc RADIFAST PGPR + 20 cc RADICOS + 10 cc ORTEK / 100 litri di acqua

Ripeter il trattamento a 10 giorni.

Nel caso in cui non si ritenga necessario l'uso di uno dei 4prodotti, aumentare le dosi degli altri 3 del 50%.

Distribuzione con Dosatron al 1%: soluzione madre 9,5 litri di acqua con

100 cc TRIXO + 100 cc RADIFAST PGPR + 200 cc RADICOS + 100 cc ORTEK

STIMOLAZIONE RADICALE/PIANTE STRESSATE/PIANTE BLOCCATE

20 cc TRIXO + 20 cc RADIFAST PGPR + 50 cc RADICOS d+ 20 cc ORTEK / 100 lt di acqua

P.S. NELLE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE NON INSERIRE ORTEK 30/20

Note:

NOTE

NOTE

WWW.FITOKEM.COM

fitokem@fitokem.com - tel. 0523 88 73 91